

掃葉莊一瓢老人醫案

醫

醫

掃葉莊一瓢老人本堂目錄

卷一

虛勞

中風

陰虛陽逆

勞傷陽虛寒熱

鬱

卷二

痢疾 泄瀉 便血

汗

心悸怔忡狂癲

痞脹便秘

痰飲喘咳水氣腫脹

脾胃

脘脇腹中諸痛

氣瘕疝腸闕格呃逆

卷三

瘧疾

夏暑溫熱

春溫

痘疹幼科雜治

卷四

遺精淋濁尿血

氣鬱發黃

痿痺

癰瘍痔漏

疝毒淋帶

經帶
婦科雜治

附錄調經種子方

康方伯傳海上仙方

婦葉莊一瓢老人醫案卷一

無錫周小農祖校
蕭山謝誦穆重校

心經失血

虛勞欬嗽失血

形瘦體質不為濕害。經言瘦人以濕為寶也。蓋課誦動心。謀慮必由肝膽。君相皆動。氣升血溢。諸經氣皆升舉。凡安靜怡悅稍安。情志怫鬱病加。皆內因之恙。且勞心曲運神機。太酒色致傷兩途。神氣無形。精血有形也。

生地 丹參 遠志 棗仁 麥冬 柏子仁

天冬 桔梗 當歸 五味 茯神 元參

肝胃絡熱。暮熱甚。失血。

生地 川石斛 扁豆 麥冬 女貞子 茯神

久瀉利至十餘年。陰走泄而痿。肝腎真氣不主收攝。為

失血屬肝胃絡熱

脹。癰。腹。鳴。邇。日。形。寒。不。飢。不。欲。食。緣。陰。損。及。陽。暴。冷。外。加。
口。鼻。吸。入。之。寒。無。有。不。侵。及。中。土。之。陽。病。根。是。肝。腎。精。血。
內。損。久。病。務。以。飲。食。爲。先。溫。胃。甦。陽。爲。急。用。治。中。法。

人參 藿梗 木瓜 厚朴 茯苓 穀芽 益智仁

新會皮

能。食。不。知。飢。痰。多。咳。逆。當。先。理。氣。清。肅。上。焦。本。質。陰。虧。再

議。大。沙。參 白。朮。仁 蔓。仁 桑。葉 杏。仁 川。貝。母

腎。虛。督。損。都。氣。丸

前。方。用。丹。溪。補。陰。丸。午。後。頭。痛。已。止。精。血。有。形。易。虧。難。復。
仍。以。醖。補。填。陰。法。

熟地 茯神 龜膠 阿膠 湖蓮 瑣陽 人中白

天冬 五味 猪脊髓和爲丸

揖拜皆動陰不下固必陽浮升舉況隆冬過暖天氣少藏。當春生令至以乙癸同治魚固其下。

六味去丹澤加二僊知柏五味。

閱病源胗脈是肝腎精血暗虧由至陰傷及陽明之脈身半以上漸致拘束此非外來客邪也。六味加鹿茸五味勞傷肝腎奇脈不用遇煩必胛痛背垂雖有失血未可沉陰滋降以柔劑溫通補下以充奇脈。

淡菴蓉 炒杞子 茯神 炒當歸身 淡補骨脂

生杜仲 生羊肉腎

案接 中年夏秋失血再發勞煩內傷背痛腰板肝腎下虧。驕

維奇脈。不主用事。子後汗出。陰陽發泄。是包舉溫養勿遲。苟不安逸。藥必無功。

鮮河車

人參

芡實

大熟地

茯神

壯五味

金櫻膏

石蓮

炒黑遠志

勞心。至於陽痿。當以交合心腎。但中年以後。陽難充復。最不易效。鹿茸 魚膠 韭子 羌絲 補骨 舶茴香

沙苑

覆盆

五味

青鹽

茯苓

遠志

茅朮

製生

早食頗安。晚食不化。脈左弱細。右尺中虛動。是脾腎兩虛。自陰傷及陽。以陰藥中佐以溫煦。以坎水中真陽內崇也。

早服都氣加河車

午服異功散

初春脈動而不鼓。亦收藏之司淺矣。當壯年未育。晨吐鹹

下橫及上

痰皆水虧火炎精氣不充之象。胃旺能納穀。當專理下焦。不必以痰為慮。牛骨髓一具。羊骨髓熬去渣。海參膠。

澹菜膠 線魚膠 龜鹿膠 熟地 兔絲子 芡實

覆盆子 金櫻子 家韭子 茯苓 五味子 建蓮

遠志肉 製首烏

少年奔走勞動。動則陽升。陰氣不主內守。咳非外感。豈必肺傷。必情志未堅。龍相內灼。衝陽上舉。致咳。醫見咳治肺。非辛解。即寒涼治。不中病。徒耗胃口。食減其病日凶。病人自述。自腰以下。筋脈不束。竟夜不寐。晨必欬。嘔中下損極。顯然明白。

桂枝木 南棗肉 炙黑州 白芍 白飴糖

培葉莊方案

下損

能食反瘦。久嗽夜甚。中年精血不生。下損難愈之病。

牛骨髓 猪脊髓 淮山藥 茯苓 懷熟地

羊骨髓 湖蓮肉 山萸肉 芡實

久損之陰不復與。柔劑滋填。 鹹秋石 阿膠 熟地

天冬 茯神 元武版知母 川斛膏和為丸

下損及胃

中年脈細便燥。五液不充。即是陰虧。長夏失血。交秋再發。食減什三。為下損及胃。勞怯難愈之症。用藥不宜偏寒偏熱。但主養精血有情。勿損胃口者。

芡實 龜鹿膠 建蓮肉 九蒸熟地黃

山藥 五味子 猪脊髓 牛羊髓

脈小數。是精血內損成勞。陰虛生內熱。久而不復。陽氣不

傷夜不成寐。以包固大氣。

一炁丹

河車

秋石

紅鉛

乳粉

迷

形瘦脈虛。左部空大。嗽病三年。行走氣喘。據從臍下氣衝。必咳甚而嘔。經言久咳不已。則三焦受之。乃他處累及。非治肺矣。思下之任脈失任。衝陽由胃及上。犯肺致欬。須固下。攝納滋養。腎病在下。必先形容憔悴者此也。五味子

人參

鹿胎

骨脂

茯苓

坎炁

胡桃

菴蓉

陰陽虛損

脈細小。色白。食少。不易運。形容入夏更瘦。不獨精血不充。氣弱易泄。不耐煩勞。此臟陰腑陽交損。補三陰為是。

人參

熟朮

茯神

芡實

白芍

歸身

北五味

熟地

桂圓煎湯和丸

老勞過更食
或氣喘

培葉莊方案

月老劉子

四

病是老勞不肯充復。入夏時令熱燄。氣泄形肉日瘦。行重氣喘。納食日少。平昔喜用冷食。只宜用生。鯀四君子。

人參

麥冬

北五味

熟術

茯神

炙艸

熬膏

課誦煩心。情懷憂慮。五志之陽鬱勃。少伸。直升直降。遂發肛瘍。久而成漏。最難復為。勞怯必開懷怡悅。用藥全以胃氣為主。人參。蒸白術。茯神。陳皮。炙甘艸。

腎損發喘

面色青黃。鯀垂入尺。吸氣短促。如喘。身熱尤甚。此皆精血下奪。氣不歸元。肝腎損極。不復雖填精充髓。病深未必能效。鮮河車。山萸肉。山藥。茯神。熟地黃。芡實。

北五味子

白蓮藕搗取汁

今夏血症再發。入秋音啞。喉痛。陰損難復。

血症音啞

失血衝逆喘者
氣喘

勞傷失血食減
胃虛

老勞吐血痰頻咳
喘急

生地 麥冬 天冬 北參 茯神 阿膠 鷄子黃

脈下垂右大深春失血入秋半不復飲食仍納無以充長
精神由精血久損肝腎不納行動則喘語言氣怯著枕衝
氣上逆咳喘皆損及八脈不易治之症

河車 杞子 北參 沙苑蒺藜 湖蓮肉 大麥冬

人參 茯苓 熟地黃 山藥漿同河車膠為丸

脈數虛右大入夏咳嗽失血遂飲食頓減此屬勞傷內因
以養胃陰甘藥乃土旺金生之義

黃芪 北沙參 苡米仁 炙甘草 黃精 茯苓

老勞有年今夏血痰吐後不但頻嗽不已身動喘急不止
此乃下元氣不收絀以攝固腎臟不與肺喘同治

下損吐血形脫便
澀飲喘不吐欲延
生

培元補方案

鮮河車 塊苓 熟地黄 紫石英 北五味子

胡桃肉 湖蓮 補骨脂 山藥粉糊為丸

自正月間吐血至今形瘦氣短身動尤甚飲食仍用大便
溏着枕臥息不安欲得坐起此下焦衝之氣冲上遂令喘
欬不已痰係脂液所化吐咯永不清爽下損勞怯症最
易治。 人參 紫石英 五味子 坎炁 石殼湖蓮

瑣陽 茯苓 山藥粉糊為丸

壯年脈形數垂入尺痰多曾嗽血冬底盜汗顯然真陰不
旺精血難充若不加保養久延成怯。

人參 熟地黄 山藥 茯苓 芡實 建蓮肉

牛膝 五味子 河車膠和為丸

向來體質。是下元不足。上冬過暖。氣泄暴冷。直侵暴嗽。僥不能卧。痰多血冒。已是下焦厥逆。干上。夫不卧之症。有餘者。治肺不足者。治腎而參芪乃補中脾胃藥。其見効之故。是從中堵截。聊以遮欄。架隔其冲脾胃。得醒穀進精氣少。麤究竟隔二三治法。非上乘工夫也。當以河車膠益衝任。以包舉大氣。以臭穢。是下焦上泛。用重濁之補。以填之。乃至理也。下午餘功。以四君子湯益土生金。用之勿急。確守可愈。非比客病傳變。朝更夕改者。先天原弱。繼以病傷。是症精血不肯生旺。陰不戀陽。陽浮氣升。煎方以酸收重鎮。滋陰填精。効調攝大旨。忌食辛辣。不宜夜坐。及奔走之勞。久服可冀復元。

狀血

及上
久勞自下損

金櫻膏

青鹽

芡實

礞石

龜鹿膏

山黃肉

胡

熟地黃

胡蓮

阿膠

瑣陽

北五味

雲茯神

少壯血小數。垂尺及澤穴。男子精血不肯充旺。情萌肉震。陰火即動。此失血欬嗽。外寒內熱。非外來客病。自能保養。不致成怯。用藥不過治偏。無關於生長身中之精氣。

復脈湯去參桂薑。加入北沙參。甘肅漿。

病乃陰傷。已及陽分。形羸背寒。河車丸包舉填精。究屬濁陰之藥。必兼建之中陽。以崇生氣。若盤欬治血滋陰。必然敗壞決裂。

紫衣胡桃

米糖

煨薑

南棗肉

白芍

炙甘州

血後欬嗽。食減子後汗泄。虛損雖自下起。驗諸色脈。扶中

更要理嗽。清涼愈治愈出。異功散

形氣精血消憊。生生不來。豈艸木可以充復。古稱人參益氣。羊肉補陰。咽喉如痺。佐秋石為外廓。取鹹味。直至至陰。

人參

雄羊肉腎

赤石脂

鮮山藥

搗漿丸。再以秋石為丸。

病原。春是陰傷及陽。其外寒內熱。惡食。強食嘔。以及泄瀉。皆滋潤涼藥。希冀治嗽。嗽仍不止。胃反受傷。然虛損為肝腎病。當此地位。以脾胃進穀為寶。莫言治病。

戊巳湯加入茯苓

診左脈浮弦。右大而緩。視面色痿黃。膚乏淖澤。據述瀉血已二十年。頻用清涼止血。血仍不止。食減神困。改進參朮甘溫有效。此乃救前藥之謬。未明病機所由來。夫積勞者

今陽傷金匱云脈大為勞虛極者亦為勞聖人明示大而
勞者宜理陽虛而勞之必宜理陰自血去太過自述大腿
跳躍按之不息腎液肝血無以養骨營筋內風翔動致奇
脈蹻維全不司其約束腑陽臟陰奇脈交損中年以後最
難充復日就衰憊宜矣論久病內傷必究寢食今食少艱
運寐少寤多莫言治病當固護二氣之衰再參天運地氣
之勝復斯身中陰陽消長必有合也

人參 生益智仁 木瓜 生於朮

附方

人參

芡實 大熟地炭 茯神 五味子 石蓮子

附方 北沙參固本加阿膠 又加芡實山藥茯神蓮肉

生脈合六味去丹澤加女貞芡實 都氣湯加青鉛

固本加茯神芡實阿膠五味蓮肉龜版人參鬚

八珍湯料為末加河車膠和丸

形瘦脈細色奪下焦氣衝心痛咳甚此肝腎精血內虧衝脈之氣逆上所致此治肺清潤無益乃內損之症最不易治熟地 茯苓 五味 芡實 石蓮肉 炒黃山藥 盼脈左部弦大若有鋒銳右脈如數按之虛濡述上秋失血夏季再發交秋欬嗽甚必食穀噦嘔而出凡人身左升主肝右升主肺左升太過必右降不及木反形金氣不肅化而咳咳甚而嘔况冲年陰火易動龍相交熾胃少寧靜越人有下損及胃之文此皆內動精氣之恙苟非屏絕慾念怒勞徒以藥餌為治草木無情之物不能充精益髓耳

人參 飴糖漿 蜜炒新會皮 炙甘州 生白芍

南棗肉

脈右弦大數。左小數。據述。捺持過煩。遂欬嗽失血。血止半年。不復肌瘦色奪。身動喘促。鼻息有音。咽喉乍痛乍緩。顯然精血枯痿。下焦元海。乏收攝之權。陰不上承。但有衝脈浮陽升舉。有升無降。無秋收冬藏之應乎天地。故清涼潤肺。無濟乎喘咳諸症。皆由根本下怯。子令母虛。此謂內損。艸木藉其偏勝。攻邪精血有情。藥味未能充長。故啣藥無功。惟潛心屏俗。靜處山林。寒暑一更。凝然不動。間有病痊者。早晨服瓊玉膏。午服人乳。色眇白。脈小不食不飢。便溏不爽。久坐脊骨痛。與行動如

喘此精氣內奪。失血內損。味復。更加時瘧。再傷。涎沫湧吐。
五液所化。非陰臟之藥用。能宜參建中湯去薑。
攻毒金石重墜。其氣流入骨髓。內蒸燥液。漸致內損。虛怯。
凡滋養黃地之藥。決不應病。當常以青鉛數兩打薄。每日
煮汁。用於煮粥。煮飯。經年搜剔藥毒。

方用聚精加茯苓

夏至陰氣不生。乃損不能復矣。今當大熱。氣泄愈甚。百脈
諸氣皆空。脂液盡耗。難更甦。為寒為熱。無非陰陽互乘。陽
由陰上越。則頭顛痛。風木之火入中。則嘔逆。欬喘。總之液
涸神竭。進兩儀瓊玉。扶至稍涼。再為酌量。

人參 麥冬肉 竹葉 大麥仁 烏梅肉

鮮荷葉搗汁 水煎沉冷服

勞損三年。冬季病發。遂音啞無聲。入春乾欬欲涼飲。大便秘。不實。所幸胃納頗安。以固攝下焦。望陰得上承。庶可延年。

熟地 茯神 芡實 川石斛 山藥 湖蓮

脈左數甚。夏季嗽血。入冬聲嘶。喉痛。陰損成勞。藥不易治。

生地 甜北沙參 麥冬 阿膠 川斛 生雞子黃

脈細促數。是腎精肝血內耗。欬必嘔吐清涎濁沫。此衝脈逆氣。自下泛上。氣不收納。喘而汗出。根本先撥。藥難奏功。醫執見血為熱。見嗽治肺。是速其凶矣。

人參 胡苑肉 秋石 熟地 五味子

陽傷背寒。陰損發熱。久嗽失音。延及喘嘔。兩三年來。容瘦。

膚枯。諒非外邪壅遏。由營衛偏枯。勞損成疴。

黃芪 阿膠 棗仁 歸身 牡蠣 炙甘州

虛損欬嗽

暑解熱止。欬喉息有音。痰涎沫。此腎陰不固。虛熱浮溢。致欬。非湯藥可愈。戒酒色。慎怒。可安。否則延為勞怯。

都氣湯中加入 秋石 清阿膠

向有失血陰虛。春夏又病時氣。秋咳。倉舌根白胎。形質真弱。以熱傷津液。治用復脈法。

生地 麥冬 阿膠 炙黑甘州 麻仁 南棗

勞損夜熱。欬甚。皆陰虧。無以攝伏陽氣。衝脈皆冲上。擾為欬。若以清肺治欬。欬必不愈。必致胃傷。廢食矣。

水煮熟地

五味

天冬

女貞實

茯神

何膠

脈數形瘦久嗽不止

六味湯中加入

天冬麥冬

色蒼脈數嗽已半年納食不多姑以甘涼潤劑不得犯胃

生白扁豆

玉竹

桑葉

大沙參

麥冬

生艸

寒熱半年嗽血前後胸背相映刺痛是過勞受傷營衛二

氣空隙法當甘溫益氣莫與清涼肺藥

歸芪建中湯去薑

附黃芪建中去薑加

牡蠣

失血後欬喘不已行忤氣喘心熱脈細數促此下焦肝腎

精血傷損陽浮上熾為欬故清肺寒涼則謬

復脈湯中去人參

寐則噓欬陽氣不能收入陽蹠痰綠色夜不能寐着枕此

為腎病。薛氏加減八味湯中。加入紫衣胡桃肉。鯀左數。欬必下氣上冲。此為陰虧。乃怯症之根萌也。

熟地 茯神 芡實 五味 山藥 建蓮

盼得闕前搏大。納食頗多。據說飲酒食醃味太過。致嗽血失音。且形瘦面赤。從木火刑金治。凡酒客不喜甜膩藥味。

枯黃芩洗生石膏 知母 滑石飛生甘艸 川貝母

左升從肝。凡相火內風不寧。胃津化痰擾肺為欬。而誦讀久坐。都令君相上乘。臟陰不充。必夏至漸生。斯時且勿攻苦。養至白露可愈。熟地 山藥 女貞子 芡實鹽

杞子 黃肉 鹹秋石 茯苓 建蓮肉 豬脊丸
因痢陰傷。宿病欬嗽痰多。是下焦陰不上承。五液泛而為

為痰涎藥難奏功。必須安養。待精氣充復可愈。

熟地炭

芡實

茯苓

炒山藥

湖蓮

川石斛

時氣熱病久延傷陰。遂有失血欬嗽。夏秋晡熱倦懶。暑熱受傷氣也。只宜養胃腎之陰。不必以其欬嗽而治肺。

復脈去參薑桂

右脈虛大色奪形瘦。肌熱瘡痍。欬嗽經年。曾經失血。是津虧氣餒。由精勞內損。但理胃陰。不必治欬。

金匱麥冬湯去半夏

脈數虛右大。久嗽咽喉痛。足冷。是虛陽氣浮越。引導不應。曾服八味丸。大造去人參牛膝。

中下交虛。痰多嗽甚。血止。下焦冷。寅卯莖舉。是陰不攝陽。

花

陽自獨升獨降。冬失其藏。春深怕發。

熟地 花苓 芡實 五味子 山藥 建蓮肉

久嗽食減痰多氣短。與 麥冬湯

數年以外失血。形瘦食失。行走風喘。自述交夏血症必發。發則左脇有聲。由下而上。蓋肝陽內風。旋動血溢。皆腎水不主生木。若能安養怡悅。尚可帶病延年。

九製首烏 旱蓮草 天門冬 方解青鹽 茯神

雄羊肉腎 女貞子 枸杞子 麋角膠

診脈左部平和。右關弦大帶滑。此失血並非虛損。問胸脘不與。是陽明胃氣不和。氣逆則擾動血絡。只宜整戒酒肉。辛辣。胃和即愈。不須介懷。

紫降香剉末

金川斛 桔梗

廣皮

杜蘇子

杏仁

枳殼

萊菔子

蚘細。噎血。病從下焦。氣衝根怯。宜戒酒色。晏守百日可旺。

六味加

車前

牛膝

服麻桂湯藥失血。咳噎不已。過辛溫耗散動絡。姑以甘柔

藥緩之。炙黑甘艸湯

脇痛失血。數月不止。

降香末

桃仁

茯苓

桑葉

牡丹皮

苡米仁

藕節汁

蘇子

韭菜根汁

脈小弦虛。久嗽失血。盈碗血止。仍然納食。晨起頃嗽甚。此

勞傷嗽血。宜養胃陰。治肺無用。甜北沙參 炙甘艸

黃芪

百合

白芨

南棗肉

蒸和丸

左脇痛必血溢黑點塊。終有凝瘀。病發無用通絡消瘀。

藕節

桃仁

降香末

勾藤

蘇子

漏蘆

脈左如刃鋒多。噎夜少熟寐。噎甚必血溢。此衝脈中陽升。乃下元精血不足。澹當滋填實下元。若但寒涼熱清必致胃減便難調治。

地黃

元武版

茯苓

芡實

阿膠

山藥

湖蓮

藕汁膏

人乳粉

脈左空右濡。右脇先痛。繼以噎痰血塊。此肝胃絡傷。都因情懷不舒之鬱。形瘦食減甘緩主治。

生黃芪

南棗

柏子仁

炙甘艸

當歸

茯神

形瘦脈數。長夏見血。入秋發瘡。皆陰分不足。不耐時候熱。蒸發洩。趁此胃口頗旺。只要靜心保養百日。不及一年可

復

秋石

熟地

麥冬

阿膠

湖蓮肉

澹菜膠

五味子

龜版

茯苓

山藥

加蜜和為丸

少年脈數形瘦。是先天遺熱。真陰難旺。血上溢。陰虧無以制陽。瘧熱再傷其陰。血來更頻。延及損怯。當以靜藥補陰。不必苦寒傷胃。

熟地黃

山藥

清阿膠

秋石

大麥冬

山萸肉

茯苓

形充脈小。痰嗽帶血。此非陰虛火升。乃辛燥劫動胃絡。只宜薄味清養胃陰。戒酒肉煩勞可安。

茯苓

冬桑葉

炒黃川貝母

大沙參

甜杏仁

苡米仁

脈左數大而堅。用力致傷氣。升血上。靜坐安養。百日可安。用養肝陰和胃陽方。

細生地

川石斛

大沙參

白扁豆

大麥冬

清阿膠

搏

誦讀心煩。陽易動。陰不能守。血隨氣升。所喜胃旺。苟能安閑保養。經年不發。其脈絡日固。藥以壯水制火為主。

熟地黃

山藥

建蓮肉

大麥冬

龜版

山萸肉

五味子

茯苓

遠志肉

川石斛膏和為丸

勞力絡動失血。脈大寸搏。能食欬。噎。用甘藥養肺胃之陰。

白扁豆

北沙參

麥冬

細生地

茯苓

丹參

久有欬嗽。涉水用力。勞傷失血。寒熱不止。皆營衛單弱。

歸芪建中湯去薑

一方并去飴

痰中血。不因咳。噎而出。納食漸減。此胃絡受熱。氣不降。津變以甘涼潤降。則不傷胃。

甘蔗搗漿 川石斛 生扁豆 大麥冬 茯苓
此勞力所傷。失血能食無力。當養氣以生精血。

生黃芪 當歸身 淡苳蓉 茯苓 牛肉膠和丸
脈數失血不款。而槁勿進陰藥。扁豆 苡米仁 棗仁

茯苓 川石斛 炙甘草 秋石少許沖服
陰奪陰損。心動陽升。壯年失血。成怯。所喜胃旺。只要戒慾。
整廢讀書。勿動心。持百日。漸可復。

熟地黃 山藥 芡實 女貞子 茯神 湖蓮

冬月無明。衝悸失血。心中惶惶。無主。精血暗損。浮陽內震。
法以鎮固。紫石英 杞子 萸肉 棗仁 龍骨 五味子
過動失血。升降失和。阿膠 茯神 天冬 鮮生地

大麻仁 柏子仁

勞力陽氣發洩。血絲自溢出口。乃脾營胃衛受傷。法當甘藥調之。

芪建中去薑加 苡薏仁

嗜酒沉湎。胃虛絡熱。加以煩惱易怒。肝膽氣火易熾。納食味不甘美。腕悶當有噯氣。肝陽犯胃。血必帶痰而出。從來酒客喜食爽口之物。不用滯膩甜食。脈大為陽氣上逆。滋陰如地黃于肉。皆與體質不相投矣。

茯苓 丹皮 川石斛 生穀芽 桑葉 降香末

久病失血。食少便溏。脈來虛小。當以後天脾胃為要。清氣滋水為第二義也。戊己湯失血後臥着。倉甚欲坐。不飢勉強納食。脈細促。兩足皆冷。

此元海氣乏不納。衝脈之氣逆冲。虛怯門常有。竅不易治。

熟地炭 牛膝炭 石蓮蓬 炒山藥 真桂心

紫石英 芡實

脈左細數右關弦大。失血兩三年。欬嗽不已。行動氣塞。脅膝痠痛。顯然下焦不主收納。是精血內損。胃納頗安。議從填實下元。勿以治嗽肺藥。反令妨胃。必戒怒勿勞。庶百日可望小效。經年堅固乃安。熟地 魚膠 山藥 芡實

五味子 茯神 湖蓮 沙苑蒺藜 金櫻子膏丸

氣過辛散。肺氣散越。穉年痰血。以益胃陰供肺。

白扁豆 大麥冬 茯神 北沙參 肥玉竹

秋暑失血。初春再發。右脈大。頗能納食。金匱云。男子脈大。

為勞。極虛亦為勞。要知脈大為勞。是煩勞傷氣。極虛為勞。是情慾致損。欲驅病根。安靜一年。可期其愈。

黃芪

苡米仁

南棗

北沙參

炙甘草

白朮

脈細而瀕。氣衝失血。寐欲遺精。今納穀不運。神思日倦。緣操作太過。上下失交。當先治中焦。心脾之營自旺。諸症可冀。漸復偏寒偏熱。都主剝喪真元。宜禁。九蒸於潛木。

人參

茯神

歸身

白芍

棗仁

廣皮

炙甘草

當夏四月。陽氣大升。體中陰弱失守。每有吐血。神煩。已交夏至。陰欲來復進。甘藥所謂下損不得犯胃也。

熟地黃

茯神

芡實

山藥

蓮肉

甘草

絡脈空隙。氣必遊行作痛。氣慮春末夏初。地中陽氣上升。

血從氣溢。起此綢繆。當填精益髓。蓋陰虛欬嗽。是他臟累及于肺。若以清涼治肺。必然胃傷食減。立成虛損。蒙其害者累之。海參膠 麋角膠 淮山藥 山萸肉 芡實 茯神 北五味 湖蓮肉 金櫻膏 水煮熟地黃 失血以來。氣從少腹上衝。即欬逆坐起不得寢。乃腎虛不司攝納。衝脈上升而然。夫衝脈即血海。男子藏精。女子繫胎。今精氣內空。血獨升舉。食入瘦泄。火土交僊。時師每以清涼治肺。治欬。不過通套而已。非論病也。紫胡桃霜

人參 茯苓 淡骨脂 紫石英 鹿鞭子

溫邪未得清理。食葷太早。蘊熱攻絡。欬嗽失血。必薄滋味。通效。 茅花 地骨皮 桑葉 茯苓 苡米仁 百合

大沙參 生甘草

嗽血三年。咽痛聲嘶。腹大便溏。是清寒治嗽太過。嗽仍不減。胃傷陰耗。陽乃獨升。甜北沙參 生扁豆 茯苓

苡米仁 生藥 炒芡實

額準痛齒縫出血。口苦舌乾盜汗。或表散或飲酒。更助陽泄。愈加不安。皆陰虛陽浮。當以靜藥益陰和陽。熟地

龜版 秋石 茯苓 牛膝 黃肉 阿膠 五味

桑椹辛熱。肺胃受灼。每交夏四月。陽氣上升。遂致失血。以甘涼清肅忌食厚味可愈。川貝母 地骨皮 花粉

肥知母 苡米仁 生甘草

少年腸紅。陰氣走泄。欬嗽吐痰。食仍進而聲嘶。氣促走動。

若喘且口乾咽燥。飲水渴不解。明係陰不上承矣。

六味湯中加入 炒桃仁 當歸鬚

中年失血兩日。陡然舌強無聲。四肢麻木。身痿足熱。此水枯木火化風。腎肝之病。靜養方可向愈。

生地 麥冬 阿膠 天冬 川石斛 龜版

寢食如常。自上年失血之後。巔頂及周身肌膚發疥癩。搔癢。春發冬瘥。以和血平調方。三角胡麻 製何首烏

金銀花 桑葉 浙甘菊 炒黑杞子 紅棗肉為丸

胃減吐血。後早晨面腫。晡暮跗腫。氣分乃弱。且理陽明。

生黃芪 苡米仁 生甘艸 生扁豆 茯苓

久欬痰帶血絲。納穀已減。絡熱胃損。宜要戒酒辛辣甘寒。

不傷胃者宜之。

青甘蔗汁

麥冬

玉竹

沙參

知母

川貝母

春季痰嗽帶血。交冬血大吐。頭痛口糜。是陽不收。藏當填

鎮。熟地炭

萸肉炭

牛膝炭

五味

茯苓

青鉛

失血五年。今夏秋發作。竄重。脈左瀯右弦。衝氣逆則咳甚。

天明汗泄。議用柔劑。陽藥以治下。病者四十三歲。

紫胡桃肉

茯苓

五味子

炒黑枸杞子

沙苑蒺藜

芡實

紫石英

石殼湖蓮

接

案失血發數。臥枕氣衝至喉。似乎痰阻。其實吐咯不出。此

任脈不司。擔任衝脈。陽氣直冲於上。納食多。受下損及胃。

秦越人尚稱難治。便澹。凡填補下之。必佐益胃。氣忌清肺。

寒潤更傷中氣。

大造丸去

天麥二冬
黃栢牛膝

加入二僊丹

人參

河車

熟地

龜版

五味

金櫻子

芡實

夏熱勞力飲酒助熱洩氣血後欬嗽脇痛火升已是肝腎
陰傷胃逆多噎須慮食減。熟地黃 茯神 北沙參

天冬

阿膠

建蓮肉

人中白

川斛膏和為丸

脈緩寒熱失血自述負重傷力已是營衛兩怯當以甘劑
益中勿見血輒與滋涼。芪建中湯

飲食先減中焦已怯辛辣都主走洩真氣二次反覆血來。

皆夜動不寐而至因勞而發內經曰勞者溫之取乎溫養

氣分也。

黃芪

白芨

茯苓

米糖

米仁

炙州

奔走動陽失血繼而欬嗽吐痰由真陰虧損五液蒸痰趁

此胃口頗旺。以靜藥填陰攝陽。熟地水製 阿膠 女貞子

天冬 米仁 刮白龜版 鹹秋石 知母 霍山石斛

血脫補氣。况汗血竝至者乎。冬令 人參 生芍 扁豆

熟地黃 玉竹 茯神 花蕊石 童便

脈微而嘔。失血之象也。膈胸胃隱而痛。肺胃之絡也。

當歸鬚 炒黑山查 苡米仁 赤芍藥 川鬱金

絲瓜絡 通艸

冬至已近。氣候太溫。少陽先升。地氣不藏。發越之性。無物不垢。所以吐血之症。皆發矣。熟地黃 女貞子 葛艸

炒白朮 苡米仁 玉竹 旱蓮艸 炙甘艸

聲不變而粉紅。濁痰不已。是絡傷。非肺傷也。所以膈內痛。

白芨 麥冬 蒸朮 米仁 苦參 北參
中氣不攝。非陰弱吐血可比。勿進陰藥。
炙甘草 牡蠣

四君子湯中加入 牛膝 玉竹
盛體失血。作酸愛逆。脈得左澀右弦。合引血干之條。曲直
作酸之旨。責之厥陰。中陽氣上乘為治。

旋覆花 代赭石 老枇杷葉 塊茯苓 新絳屑
脈左數搏大。因驟然跌仆。吐血仍然。安穀如常。此陽氣暴
升。莫制。絡血不得寧靜而泛越。夏三月至秋分。戒嗔怒情
慾。莫令舉發。六味加入 秋石 阿膠 川石斛
春暖陽氣升越。行走動陽失血。只宜安養靜坐。藥以甘緩。
不傷胃氣。

風濕咳嗽初愈。暮汗繼以痰血。春半陽氣發洩。中年陰未
克盛。致血隨氣溢。讀書聲高則頭痛。陽升顯然。

六味去萸肉加入 白芍 阿膠 麥冬
脈緩大吐血甚多。仍然安設。此陽明胃絡病也。戒奔走煩
勞。方可冀其奏效。

生黃芪 薏苡仁 南棗肉 山漆 茯苓
暑熱傷氣。秋燥上加。亦令傷氣。舌乾咽痒。欲噎。胃氣不充。
肌膚已曾失血。兼保陰液為宜。擬用。

喻西昌清燥湯減人參。

老年因秋燥咳嗽。食少胃弱。脈小數。當以清潤甘藥。不數

南沙參 玉竹 桑葉 象貝 吧咀杏仁 炙甘草

肝風頭旋
目暗

肝風目脹
昏逆

肝風眩厥
心悸

脈虛數形寒。心中煩熱。五更後氣升咳。當秋分節。燔金
司令。大熱發泄之餘。皆能化燔。肺為嬌臟。竅處上焦。先受
其衝。宜潤燥以滋其化源。冬桑葉 大沙參 玉竹

南花粉 生米仁 蜜水炙橘紅 白糯米泡湯煎藥
中風門

過勞陽動。內風上蒙。清竅頭旋。目暗。上實下虛。若能保養。
冬藏可安。炒黑杞子 甘菊炭 穀精珠 牛膝

稽豆皮 女貞實

此肝風升舉。目珠脹咽。塞嘔食下。焦獨冷。常年久瀉。今反
便難。石決明 香附汁 夏枯草 草決明 生神起
眩厥心悸。咽中填塞。汗泄畏冷。都主肝陰虛餒。陽明內風。

肝風眩暈
吐酸

肝風眩暈
耳鳴心悸汗
出

內風眩暈
悸

上巔。生牡蠣 天冬 稽豆皮 阿膠 茯神 小生地
凡動皆陽衝氣至腕。嘔酸。乘巔旋運。食漸減。肌肉消。是肝
木之陽趨胃。久而陽化內風。直上巔頂。而為暈矣。煩勞操
持。君相過動。所致。情志之病。不專功於藥餌。

石決明 生地 柏子仁 阿膠 天門冬 茯神

耳鳴眩暈。心悸。寐醒汗出。身汗從牙宣。失血所致。此皆肝
腎致傷。內風勃升也。生乾何首烏 冬桑葉 茯神

黑芝蔴 天冬肉 甜北沙參 蜜丸 秋石湯送下

肝風頭暈。枸杞子 當歸身 桑葉 蒺藜 何首烏

甘菊花 炒白芍 塊荻苓 天麻

五志中陽氣冲搏。心怔悸眩暈。多勞多怒。老人腑液乾枯。

內風掀越使然。

生雞子黃

柏子仁

生地黃

茯神

清阿膠

天門冬

內風顛眩

入秋一月。天令肅降。脈得左寸搏數。左關小弦而動。是心煩。君相少寧。肝陽變化。內風陡升。莫制。顛頂皆眩。腦後筋惕。何一非陽動所致。此皆陰弱不主配。非肝臟有餘之比。法當益水滋木培母。另開養心脾之營。使上下不致龐雜。肝腎方以攝固。柔溫宗聚精七寶法以治之。

赤白何首烏

赤白茯苓

方解青鹽

番舶茴香

補骨脂

鯉魚膠

沙苑

北五味子

蒸餅和為丸。

臨卧服心脾益氣養營方。用歸脾湯去芪桂。

六七年病。猶然納食行走辦事。凡肝膽之氣從左升直至

肝火熱厥

肝虛目疾

內風旋越精
濁內任

肝陽內風

巔頂風木必尅土位胃脘似乎悶外象若冷為深當以

龍薈丸苦降治之。龍薈丸

肌腠乾燥而目因起翳肉不飢仍能進食神識盡昏夜慧
詢中年鰥居而陽事易痿有夢遺精其損傷在肝腎精血

首烏九製甘杞子 菊花炭 柏子仁 淡荻蓉 茯神

驚必動肝久而陽氣變化內風旋越不已有升無降陽不
交合入陰不但遺瀝精濁入夜遑遑欲絕宜攝陰鎮陽法

磁石 五味 龜版 桑仁 龍骨 黃肉 茯神 當歸

脇左熱攻心及背痰多面腫肢麻肥人肝陽偏熾乃性情
易嗔怒所致。復服去參薑桂

瘦人稟屬陰虧耳鳴眩暈是內風陽氣之震磁石制肝陽

上吸質重鎮納歸腎。然必少用填補。于甘酸味厚之藥為合法。用之不效。乃補攝力輕所致。熟地黃 天門冬

龜版 紫胡桃肉 山萸肉 磁石 麥冬 五味

阿膠 芡實 各碾末煉蜜和為丸。每早服六錢。

五旬向衰。水不生木。則內風動越。巔頂眩暈。唇燥附無力。小便頻動。議填下元不足之陰。人參 天冬 五味

杞子 茯神 熟地 生地 瑣陽 首烏

據說夜坐久勞。腦下氣升。耳鳴頭暈。目中黑暗無光。此肝風陽氣上蒙清竅。久恐仆厥。地黃湯加 磁石 五味脾胃居右。氣行于左。左手痿痺。不知痛癢。不能把握。所謂胃氣虛。則不用者是也。王金壇云。偏枯之病。未有不因真

風痺

氣不用。旨哉斯言。治痿專培氣分。補而宣通。可望其效。

人參 黃芪 生白朮 附子 生川烏頭

右股痿痺無力。甚於秋冬。緩於春夏。是陽氣不足也。但三旬壯年。不宜有此。芪附湯

右痿舌瘖無聲。脈小微滯。病起上年十二月。仍能納食。此中於脾絡。治以宣通靈竅。白附子 熟半夏 茯苓

鮮石菖蒲根汁 薑汁浸竹節 早服地黃飲子

脈緩。男子右癱麻木。丹溪議從血虛有風。思起病值冰雪寒威。以舒筋湯。黃芪 當歸 桂枝 羌活 防風

撫芎 薑黃 桐皮

半百已外。陽氣日薄。衛弱不司護衛。右肢麻木。風虛也。

芪附湯合玉屏風散加桂枝 甘州薑 棗

附方 二陳湯加生白芍桑葉羚羊角竹瀝薑汁法為丸。
中年麻木筋脹陽氣已衰內動自動最怕痺中脈微色痿。
宜溫補通陽。生黃芪 生於朮 炙甘草 熟附子

南棗肉 老生薑 後加人參

脈靜寢食便調向有胃痛飲煖燒酒相安。今年春季跌仆。
右肢偏麻語音不爽是皆氣傷痰阻致內竅少靈也。

白金丸 菖蒲根汁法丸

木煎金化右痿太陰受邪聲嘶厥陰亢極目瞋內風擾動
汗出呼欠頻陰陽欲分面渾澤外越之象也先擬熄風
輕通之法由節令初升之故耳。羚羊角 鮮石菖蒲

生牡蠣 馬料豆 天麻 橘紅

接案 目瞋戴陽。脈空大。肝風正甚。易回也。 鈎藤 白芍

生地 羚羊角 料豆 桑葉 玉竹 川石斛

接服 人參 杞子 遠志 白芍 熟地 北五味

大熟地 茯苓 巴戟 橘紅 後改歸芍六君子丸

素乏深藏。適逢冬陽泄越。真陽從陰中走出。金反畏木。右

縱左拘。神清志昏。上實下虛。數日外。腑氣不泄。使陰陽漸

交。方可商治。 人參 淡附子 炒遠志肉 炒熟地黃

炒枸杞子 茯神 分三丸。每次調入猪膽汁。以味苦為度。

少陰不藏。肝陽亢發。為痿痺。 玉竹 生地 羚羊角

川貝 赤芍 桑葉 知母 鮮石菖蒲 遠志 川石斛

右痰舌瘡。足癰面赤。戴陽。可欠微哕。診脈小濡而緩。此腎
納失司。肝風突震。但病起耳後暴腫。必兼濕熱。客氣清上
輕揚。腫勢頗減。七日以來。當陰陽經氣一小週天。不必以
時邪引病為惑。昔河間宣明論中。謂舌強難言。其咎在乎
舌下經脈不主流通。以腎脈榮及舌下耳。其主地黃飲。取
意濁藥輕投。機關漸靈。併無碍乎上氣痰熱。仿此為法。

熟地黃 枸杞子 牛膝 石菖蒲 淡菴蓉 茯苓

川石斛 遠志肉 梅核果

^接象左部稍振。水虧風動。左牙痛。蓋風從內旋。乃陽之化
氣。祇以春升少納。下元不司收藏。虛症何疑。况因目恙。頻
用韭子煙薰。查本州辛辣升騰。助陽損真。人於遺濁用之。

藉其升陽以涵陰。更無漏泄耳。今痲中八日。聲音漸振者。乃精氣畧有寧靜。裡竅畧有靈機。是順境也。不明此理。仍用辛泄加人參。亦是清散上焦之藥。但肝腎臟虛。在于至陰。若再投辛苦。以傷其陰。必致虛症叢起。專望其向安。倘必以上有火熱。古稱實火宜清。虛火宜補。溫養柔和。與溫熱剛燥迥異。幸勿疑訝。

生地

麥冬

女貞子

阿膠

茯神

石斛

接後

接
案二日來干支一輪。右肢痿。右足跗畧有痛象。舌竅未靈。味少甘美。虛象顯然。三日前主家以齒痛為熱。醫迎主見。即投辛涼解散。此症虛在肝腎下焦。若不固納維本。漫無着落。仍以前法加入涼肝可也。熟地 茯神 牛膝

遠志

肉 杞子

川斛

天冬

甘菊花

內風皆陽之化氣。然非有餘。是二氣不主交合。今形寒跗
脛背冷。似屬陽虛。景岳云。陽失陰而離者。非補陰何以攝
散失之陽。此病發皆主乎動。前法多以靜藥。謂病象在身
中之左。有升無降。據說舌絡牽掣。喑不出聲。足不堪行動。
與河間肝腎氣厥同例。主丹溪虎潛法。

虎潛丸

又地黃飲子。去附子。加鹿鞭子煎汁。搗為丸。

陽明脈衰。厥陰風動。頭暈心悸。肉瞤麻木。有風痺之累。少
飲加穀易安。淮小麥 北沙參 炒麥冬 南棗肉

酸棗仁

炙甘草

中年脈弦。右臂肢指麻痺。凡男右屬氣分。氣弱陽不運行。

營虛

行則痰日生。乃水穀不主變化精凝當以健中佐運為主。蓋脾胃主四肢滋陰血藥多膩為痰樹懣矣。

六君子加痰藜 水泛為丸

麻木在身半以上清陽遏阻亦夏秋伏熱致傷清上可愈。

桑葉 肥玉竹 枇杷葉 馬兜鈴 川貝母

杏仁 大沙參 天花粉

陰虛陽逆煩勞陽升

是病遇勞即發安養稍愈身心不堪煩動男子苟非素豐難以坐食耐久者不關腎藥之治病也。綿黃耆 茯神

遠志肉 棗仁 炙甘草 當歸 龍眼肉

營出中焦心脾皆怯滯補耗氣皆忌不耐煩心屬虛此辛

場葉莊方案

陰虛陽逆煩勞陽升

甘養陽養營一灑。有合乎心脾矣。人參 茯苓 桂心

炙甘草 菖蒲 當歸 桂圓煎濃湯。泛為丸。

有年勞傷神瘁。膚無膏澤。時欲腹鳴。啾痛。營虛不得流行
之象。開懷安逸。僅可帶疾延年。熟地黄 炙黑甘草

人參 肉桂 遠志肉 當歸身 白芍

養營膏子藥方 熟地黄 桂圓肉 茯苓 黃芪

人參 枸杞 遠志肉 炙甘草 當歸 五味子

形神過勞。陽動不靜。六脈皆弦大。徹夜無寐。以靜攝心。肝

腎之陰。大熟地 棗仁 天冬 青龍骨 龜版

茯苓 生牡蠣 遠志 知母 五味子

述夏令氣暖。發泄。自覺跼蹐筋骨。氣空如墜。未至深冬。即
川斛膏丸

欲煖護。魚以易怒熱升。此屬下元精血暗損。仍多持煩勞。心陽動。吸水虧。肝木少涵。平素不受溫補。及參朮益氣。議以滋填充髓主方。且痰多食少。又必顧及胃氣。

人

線魚膠

沙苑蒺藜

茯神

鹽水炙補骨脂

甘杞子

杞子仁霜

砂仁

九製赤白首烏

川黃柏

紫胡桃霜

茯苓

方解青鹽

向多牙宣。陰虛火炎。三瘡入于陰。蒸燥脂液。日加枯槁。消渴多飲。液涸引水自救。急當滋補肝腎之陰。加以血肉填精。包舉大氣。製何首烏。天門冬。麥門冬。生地黃。熟地黃。各碾末。以河車膠和為丸。能食知味。病不在上中。口糜舌絳。紫絳。喉痛腹熱。小渡甚。

少。都因肝腎先虧。熱伏于裏。陰傷陽越。汗從此泄。知母

生鷄子黃 細生地 黃柏 上阿膠 黑豆皮

接服大補陰丸中。加入 阿膠

腎開竅于耳。膽脈遶出耳後。經以腎藏液。三合。膽藏汁。三合。煩勞太過。液耗汁乾。少陰少陽樞機不利。遂有失聰之狀。中年有此。夜少風動使然。磁石地黃湯

鯀數耳鳴吐痰。天柱骨晉膝痠。兩足冷。此陰虧陽升。當填補實下。左歸去牛膝。合 二僊膏

冬至藏陽。腎主收納。今質疲陰虧偏熱。夜深久坐。陽不入陰。浮越及耳鼻上竅。先用 東垣滋腎丸。鹽湯送下。勉強搖精。致陽縮囊縱。不但形弱僂僂。肛門臍竅皆為收。

引咽。喉牽絆似垂。食物漸漸減少。由精血之傷有形。氣難自復。少陰厥陰脈循喉嚨。開竅于二陰。既遭損傷。其氣不及充注于八脈。故症見拘束之狀。上年進柔劑陽藥。服後顛頂維艱。皆脹耳。竅鬱鳴。想臟陰宜靜。可藏。試以柔與身。佈必加弱促不安。宜乎升陽動藥之不靈矣。夫少陰內藏。原有溫蒸諸法。厥陰相火內寄。惡暖喜涼。仿丹溪法。

鹹秋石 鹽水炒知母 真阿膠 栝子仁 生地

白茯苓 炒黑遠志肉 龜版 去牆搗

遇天氣鬱勃泛潮。常以鮮頭艸葉泡湯服三次。取芳香不燄。不為穢濁所犯。可免夏令時令之病。鮮蓮子湯亦好。若汗出口渴。夜坐火升舌碎。必用酸甘化陰。以制陽光。

烏梅肉

魚 冰糖

三式

畧煎一沸服

飯後茶飲只宜

炒大麥冬、漏芥片。

至其

安瀾

味苦氣降。

中虛者不宜用

帳數上或下虛當固其陰

熟地黄

麥冬

炒山藥

川石斛

杖神

阿膠

五味子

石建蓮

勞傷陽虛寒熱

血濡食少腹鳴煩倦無力此屬勞傷陽氣當與甘溫補其

營衛

苓桂朮甘湯中加入薑

棗。

身半以上為陽。天明少陽生動。乃痛。清氣陽傷矣。酒肉滯

味之補。省陰。穀助痰。耗氣。當以東垣法調之。

人參

茯苓

白朮

桑葉

炙甘草

牡丹皮

勞倦中虛陽少旋運遂腕悶不飢醫投發散消導中氣更

傷瀉瀉。

生穀芽

生於朮

生益智

茯苓

廣皮
米仁

白屬陽虛體質煩勞更傷陽氣。春季暴冷而濕脾胃之陽易困。納食不運。噎氣腹脹。皆清陽不司流行。濁陰欲聚氣滯無滯。當辛溫理陽。藉以通爽。用疎胃補脾法。

人參

塊茯苓

紫厚朴

益智仁

廣皮

生薑

因遭顛沛。胃痛食減。吐痰遂致肌瘦形寒。此中宮陽氣為思慮鬱結。日就拘束之象。東垣升陽擴充脾胃。鬱舒則陽可復振。炒焦白朮。茯苓。高良薑。煨葛根。

廣皮

炙黑甘州

紅豆蔻

煨升麻

診脈弦濡之形已退。夏秋病邪已去。但食少神不爽健。欲大便肛門下墜。是皆陽氣不復為之。氣陷不藏者。因憂思

致傷。開懷怡悅可安。不獨特藥餌。用升陽法。炙甘州

人參 茯苓 薄桂 生薑 當歸 廣皮 南棗

陽氣素虧。背部怕寒。冬月嗽甚。欲坐入春。納穀膜脹。脈左弱右弦。議濕中有熱氣。蒸肺氣。膈鬱口舌咽喉仍窒。

早服葶藶湯 夜服威喜丸

喜暖畏冷。陽氣弱。少護衛。近日耳閉失聰。非外邪客侵。由乎氣不下納所致。先用鎮逆導引主之。磁石 莢肉

菖蒲 牛膝 茯苓 熟地 遠志 五味 龜甲

夏秋氣大發泄。身中之氣久虛。無以主持。故見病治病無功。而安中納下。每每獲效。入秋進附子七味丸。頗合。今秋分後天氣漸升。地氣收斂。緣久熱傷氣。虛體未能收肅。是

以肢節時寒。顛頂欲冷。無非病久。諸氣交餒。斯外衛之陽。少護液。髓暗枯。則血脈不營。而陰乏內守。凡此皆生氣之淺薄也。急當溫養益氣。填補充形。助秋冬之收藏。豫為來春生發之用。內經有四季調神之訓。今投藥亦當如此旨。

宸胎

一具

酥炙羊肉腎

十對

熬膏黃狗脊

十副

熬膏肉蓯蓉

青鹽

九蒸熟地黃

北五味肉

湖蓮子

茯神

人乳粉

柏子霜

鮮河車

一具

漂洗

用諸膠地黃搗

和。餘劑各為末。杵和為丸。每服四五錢。人參湯下。

病久傷腎。氣不收攝。肛門如錐刺。痛而下墜。小便不利。先

議升陽一法。

生鹿角

人參

茯苓

陽起石

另研細

當歸身

生菟絲子

面黃肌減。脈數虛。形寒食少。乃勞倦致傷。不可為外感有餘議用。小建中湯。

脈濡緩無神。脇痛吐痰腥穢。漸至減食。短氣寒熱。肝病入胃。顯然勞傷不復。當歸建中湯去薑。

色奪脈小。形寒久嗽。皆營衛二氣久損。病屬勞傷。內經云。勞者溫之。損者益之。參芪建中湯去薑。

脈大緩而無力。色黃痿痺。喜暖惡涼。心下痛連及脇肋。此勞倦內傷。久則延為脾厥。脾主營。以辛甘溫養血絡。

當歸 桂圓肉 茯苓 桂枝 遠志肉 炙甘草

交四之氣熱。勝元虛。乃氣泄之候。營衛本乎脾胃。不耐夜坐。舌心腐碎。吸短。氣似不接續。中焦喜按。始得暢達。目胞

欲垂難舒。四肢微冷。失和從前調理。每以溫足三陰臟。魚
進血氣充形。病減七八。今當長夏。脾胃主氣。氣泄中虛。最
防客氣之侵。是補腎宜緩。而養胃生津。寧靜斂液。仍不可
少。俟待秋深。天氣下降。仍用前法為穩。擬逐日調理法。

人參 淡天門冬 茯神 建蓮肉 酸棗仁

知母 川石斛 甘艸 右各末為丸

欬喘頻發。脈細畏寒。乃下不納。

桂苓五味甘艸湯中。加入 紫殼胡桃肉

勞倦內傷。更為暴冷。外襲營衛不和。欬逆身痛。忌食葷酒
助邪。天暖陽和病去。茯苓桂枝湯
脈沉遲。背寒色奪。久有勞倦。新年暴冷。再擬用

桂枝加白朮附子湯

虛損暴寒外襲。小建中湯

鬱門

春交旬日。形症小愈。但右脈仍弦。舌白味變酸甜。昔喻嘉言云。當以氣雄剛藥。能變胃不為胃變。

人參 淡附子 吳茱萸 茯苓 熟半夏 生薑汁

三焦鬱勃之熱。因勞心而熾。口臭難飢。便燥。以苦辛暫用。

藿香葉 炒竹茹 黑山梔 白豆蔻 杏仁 廣皮

酒客濕勝熱鬱。脹悶噯氣無寐。得茶愈脹。先與三焦分消。

白蔻仁 杏仁 紫厚朴 茯苓皮 綿茵陳

金川斛 半夏

久痛。用辛溫而通氣血。不應病已十年。不明起病之由。今便溏溺赤。水穀酒食不運。必挾濕阻氣化。主以分消。

山茵陳 猪苓 厚朴 米仁 苓皮 澤瀉 薏仁

吞酸欲嘔吐。喜靜惡動。從鬱怒氣逆病在肝胃。此一臟一腑病。和陽解鬱。牡丹皮 黑山梔 鉤藤 鬱金

半夏 茯苓 金石斛 廣皮

掃葉莊一熟老
痢疾便血
案卷二
泄瀉

鼻癢心辣閃爍。即大便下血。形瘦脈小數。已經數年。

枯黃芩 生白芍 清阿膠

痢疾自止。頭痛至腰。二便得通。少安。議通太陽以驅濕鬱。

木防己 生白朮 紫厚朴 桂枝木 苓皮 廣皮

邪陷入裏。瘡變為痢。古稱經臟兩傷。方書都以先解外。後清裏。拙見論病先究體質。今素有血症。且客遊遠歸。從陰虛伏邪。是用藥須避苦寒。傷陽燄劫陰矣。鼻煤衄血。舌絳乾涸。陰液有欲盡之勢。奈何邪熱內迫。有油乾燭滅之危。醫見病治病。不審肌如甲錯。脈細尺不附骨。入夜煩躁不寐。議以護陰。急清陰中之邪熱。生雞子黃 黃柏

清阿膠

白頭翁

北秦皮

小川黃連

細生地

產後病起下焦為多。今右偏頭痛得煖為甚。納食則脘腹加痛。必瀉而後已。夫病隨利減。已見濕鬱氣阻。熱是濕升。恒有是症。從脾胃門調治。下血後大便燥閉不爽。繼而自利。白滑膠粘。日數行下不

禁年五旬。形衰脈沉。必因久伏水穀之濕。府病宜通。以溫下瀉。生茅朮。製附子。紫厚朴。製軍。濕多成五泄。陽氣日衰。下元不振。向有下焦痿痺。用四勛丸得愈。夏秋當用脾胃藥。

生於潛朮。木防己。川草薢。白茯苓。川桂木。瀉血原。從痢起。食物不思。垢瀉不清。致延二年不愈。

胃苓湯

濕伏為熱。先瀉瀉止。腹痛耳竅膿水。出血微淡。滲以分消。

連翹

茯苓皮

淡枯苓

紫厚朴

滑石

赤芍

蒼竹葉

煎送保和丸

脈弱形瘦。食不適。必泄瀉。此陽氣已傷。未寒下焦先冷。用

繆仲淳 雙補丸

向有遺精。腎陰不攝。正月間。糞渣積下。入秋足脛浮腫。目下漸上。遇冷為甚。脾腎丸。節天補。

久嗽是宿疾。近日腹痛瀉利。是脾胃受暑濕客氣。當先理邪。痛瀉止再議。炒扁豆 藿香梗 茯苓 炙甘草

木瓜 廣皮 厚朴

陽微濕聚成利。必溫通其陽。斯濕可走。擬用 冷香飲子。長夏入秋。脾胃主氣。濕鬱阻氣。為痛為瀉。更月不愈。中宮陽氣未醒。仍有膨滿之象。導氣利濕主方。

茯苓皮 枳殼 藿香梗 廣皮 厚朴 大腹皮 鯀微晨泄。初冬未及截陽。以脾腎治。最是納穀減少。當以

甘肅

中焦。兼理其下。

人參

炒乾薑

炙甘草

生於朮

淡熟附子

淡吳茱萸

腸紅既止。便瀉三年。火升則能食。熱墜必妨食。此皆陰氣走泄。陽不依附。當從陰引陽。赤石脂 瑣陽 五味子

水煮熟地黃

炒研末拌

禹餘糧

遠志

蒸餅為丸

脾胃虛瀉。

苓朮

羌絲

砂仁

山藥粉和為丸

幼穉夏季不食。腹痛瀉積。交冬未愈。憶今四五月久。兩潮

濕之蒸。皆令脾胃受傷。半年来虛中留滯。當疎補。兼投食

物。冷滑肥甘。須忌。

人參

麥芽

茯苓

生益智仁

白芍

炒山查

廣皮

焦朮

砂仁

神麴漿和丸

大病後。飲食起居。皆不如法。以邪陷入裏。舌乾自利。恐其

深入陰中。則危矣。

白芍

甘州

附子

枳實

平素陰虧。熱注入裏。為利。糞結便出。痛墜。診脈左堅下垂。

不以脾胃燥藥。

細生地

阿膠

炒查

穉豆皮

生白芍

寒熱腕腹脹。嘔噦。舌白利。乃久痢。不曾復元。再看風濕之

邪。

藿香

白菝

茯苓

廣皮

厚朴

澤瀉

保和丸

食物不運。太陰脾陽受傷。濕熱內蘊。氣窒。為腹脹痛下利。

據說脹起。上年痢在今秋。但主理氣溫脾祛濕。用冷香飲

子。

枳果

藿香梗

茯苓皮

木通

厚朴

大腹皮

廣皮

目紅黃。腕脹。下血紫滯。裏急後重。此夏秋濕熱。與水穀互

蒸。致氣分窒塞。三焦不清。當薄味蔬食。不致釀痢。

白菝

銀花

桔梗

厚朴

木通

茵陳

槐花

廣皮 茯苓皮

本病下損利再傷陰。從肝腎治。勿以瀉利投燥。燥則劫陰。

矣。人參 炒黃山藥 炒查肉 熟地黃 廣橘紅 茯神

夏秋痢疾大氣。水土濕熱致病。用藥都主苦寒攻消清火。

最多。但體質久。青帶淋經漏。當利起經帶交熾。因時病累。

及本病未宜香連檳朴大黃大洩之劑矣。良由下焦不固。

利必亡陰。小腸氣鬱。壅垢欲出。痛墜不爽。此宣通垢滯。又

必顧護陰氣。凡看病必究體質。勿通套混治。

細生地 炒銀花 炒黑砂糖 炙黑甘草

稽豆皮 炒查肉 炒白芍

久利久瀉。肛墜頻頻不爽。此乃腎傷。脈來數小。醫作脾胃。

病治故不效。

熟地黃炭

炒焦歸身

漂淡補骨脂

炒羌絲子

五味子

接續

久痢治法。非通即溫。既曰腎病。則陽宜通。陰宜守矣。

熟地炭

熟附

桂枝木

五味

炒川椒

炒歸身

接續

柔中佐剉利未得減下焦常冷過膝。

仲景四逆湯

厥陰下利少腹有形。

五味加茴香枳實

接續

動氣在少腹左右。糞與血或前後秋利。交冬不愈。當

溫其營。

人參

潯桂

炮薑

當歸

以水煎香拌炒

茯苓

炙甘草

脈沉遲下利血水。神呆不欲食。四肢冷。前已完穀與溫理

其陽。

人參

附子

茯苓

炒黃乾薑

生白芍

長夏痢症。皆因濕熱。繼而先泄氣。後下血。蓋變內風。混處腸絡。是為腸風。血去陰氣。日傷為眩暈無力。主以甘酸化風。益陰節勞。可以不反。熟地黃炭。當歸身炭。

地榆炭 柿餅炭 槐米炭 炙甘草

下痢腹痛。初因寒濕傷脾。久變濕熱。着於腸胃。痛利不減。腸中硬起不和。不得流通。明甚。當以苦泄小腸。兼分利而治。川連 查肉 木通 川柏 澤瀉 苦楝皮。清暑和中。痢減痛緩。醫惑于痰嗽多。以清涼視。面無華色。血氣更偏。東垣云。瘡痢都因脾弱。用戊己湯。上有鼻竅濁涕紫血下。則遺精便血。但說腎虛陰不配陽。未必上下皆病。意者本質固虛。水穀之氣聚濕。濕生熱。熱

升熱降。致上下不寧。此酒肉鮮腥。須忌。謂助其濕熱也。

生白朮 黃連 黃柏 防風根 地榆 槐花

煨葛根 茯苓 水泛為丸

上窒下墜。手太陰陽明病。下血久。兼理厥陰。

升麻 槐米 歸身 桔梗 炒芍 炙甘草

血奔腸紅。都是陰液走泄。陽浮發泄易汗。背寒心熱。臟陰
腑陽交損。形體日漸消瘦。皆衰老液枯之象。

鮮生地 阿膠 茯神 火麻仁 柏子仁 天冬

先養後血為遠血。臨便先痛。恐有濕熱凝阻。分利逐濕主

之。生於朮 炒槐花 木瓜 茯苓 地榆 廣皮

脈兩關弦虛。先血後糞。兩月未已。當年原有病根。遇勞而

發屬虛微仲景黃土湯。

黃土湯加炒焦白朮

鮮四劑後加人參一錢

陰絡傷則血內溢久藥繁當以甘藥投之。

人參 生地黃

升麻 槐米

血餘

龜版

又人參

桂圓肉

炒白芍

白糯米

赤石脂

炙草炭

泄瀉

酒客便溏腸紅是內傷之濕戒飲酒既愈夏天濕勝氣泄病發自述食腥油大便即頻宗損菴却胃水法。

生白朮

熟附子

生白粳米

炮黑薑

汗

脈弦無胃面青呻吟汗出目瞑是為肝陽外泄宜與腎同

肝陽不藏汗

培葉莊方案

肝陽外泄汗

三七

肝陽外泄為汗

心悸痛

狂癲

治。熟地 牡蠣 白芍 麥冬 小麦 大棗 炙艸

自汗不止。目閉則胃鬱。背熱如火。心悸動而汗止。此肝苦

急之候也。以甘緩之。炙甘艸 淮小麥 茯神 白薇

南棗肉 白龍骨 人參 栝子仁 棗仁

汗出亡陽。神虛畏怯。心悸則汗漏。勉議固陽守陰之藥。

人參 桂枝 龍骨 茯神 炙甘艸 在牡蠣

心悸驚恐。狂癲神昏。暈吐緩。心悸痛。炙甘艸 枸杞子 茯神 生穀芽

人參 當歸身 肉桂 後改養營丸

抑鬱頓挫。佗條無聊。心乃偏倚。十二官皆無主。則陰氣并

於陽也。投以重性之劑。

心悸

鐵落 真鬱金 半夏 苦參 塊莖 苓 橘紅
讀誦久坐身似靜。心多動。陽氣皆令上亢。陰氣無能上承。
故心悸。惟靜處為宜。藥不易效也。補心丹。

掃葉集方集

○痞脹便秘門

心痛便難

氣分上熱。吸燥津液。能令便艱。當滋養營液其心。痛必安。

柏仁 茯神 鮮生地 天冬 阿膠 炒杏仁

小腸結

腸中變化失司。胃氣不得下行。此不饑少食。因由也。夫小腸為火府。非苦不通。以六府皆陽。氣窒則變熱矣。用小溫中丸。苦藥已得小效。

蘆薈 砂仁殼 鷄肫皮 胡黃連 青皮

脾胃不和。食後不化。晡暮陽不用事。納食痞脹不寐。病起夏秋。必因時令之濕。久延半年未痊。又慮陽微濁凝為脹。滿故厚味須忌。

生於朮

煨益智

炒澤瀉

茯苓

煨薑

新會皮

臍左右兩傍按之痛。交子夜漉漉有聲。時或氣脹。此皆肝腑陽不通。欲結腸痺。非臍病虛寒矣。八味丸不効。謂此。

小茴香

川棟子

茯苓皮

青皮

猪苓

青木香

腸痺治肺。丹溪方信不謬。但酒客久蘊溫熱。亦有濕結便秘一症。當以辛苦寒專理氣分之滯。

真茅朮

製半夏

冬葵子

生石膏

山梔仁

晚蚕沙

臨服磨入大橘榔汁二匙

老年脈沉目黃。不飢不食。腹痛自利。後墜溺瀉。此長夏濕

邪傷于太陰脾位。陽不運行。濕熱凝注。法當溫脾導濕。佐辛香以宣濁。補中益氣。甘溫升守。壅氣宜乎腹脹。議開太陽溫太陰方。

木防己

川桂枝

大腹皮

生厚朴

枳果仁

新會皮

小茵陳

茯苓皮

痰滯下泄痛緩。腹脹喜按。此屬虛勞。痞為傷無形之氣。

川桂枝

川黃連

生白朮

厚朴

廣皮

寒煖飢飽失和。日晚腹中脹。脾胃氣鈍。深秋最防瀉利。

藿香

生智仁

厚朴

炒元胡

茯苓皮

陳皮

大腹皮

炒黑查肉

又橘木丸

脈沉遲。食入腹脹便澹。平昔飲酒中傷。留濕阻氣。小便不

與用香砂平胃散。

香附 砂仁

製茅朮

厚朴

廣皮

炙艸

水泛丸

血結為癥。氣聚為瘕。病在絡為脹。形寒鼓慄。已是陽微。夏季腹膨。溺少。議煖水藏。○大鍼砂丸滾水送下。○少腹宿癥。悲哀癩厥。繼而腹脹大滿。直至心下。經來淋漓。過月乃止。其脹不減。便瀉溺少。肢冷內熱。是氣血皆病。議溫水臍法。○大鍼砂丸。不飢少寐。二便不爽。經脈中牽掣。此非風寒從表。乃長夏水土之濕。與水糲之濕。互蒸氣阻。三焦不通。中年兩月不愈。恐延格脹之累。

白蔻仁

杏仁

厚朴

廣皮

苓皮

茵陳
防己

客遊勞頓。陽氣先傷。夏季濕邪。是陰鬱過身中之氣。經旨謂陽邪外寒。胸中清陽不旋。不飢痞悶。先治其痞。倣仲景薤白湯。桂枝 薤白 生薑 茯苓 半夏

自云臍脹。左脇痛。勢休息。大便日下粘濁。臨便自覺冷痛。凡五臟錮結為脹。六腑濁痺為聚。數年久病。難以廓清。議

溫下法。大黃 枳實 青皮 附子 厚朴 陳皮

經水不來。腹大足冷浮腫。此乃血分鼓脹。四大症候。何得

渺視。禹餘糧丸 接服人參 澤瀉 淡乾薑 茯苓

淡附子 又禹餘糧丸

夏秋內伏暑濕。皆是陰邪。久滯漸致食入痞滿。形寒脈小。當溫中醒陽。莫以清涼治滯。

薏苡仁 茯苓 肉桂 生白朮 猪苓 五加皮
陽微氣不流暢。腕中痞滿。噎氣。

人參 半夏 白旋覆花 煨薑 丁代赭 茯苓

廣皮 南棗肉

陽氣不旋。不飢強食。 薤白 茯苓 橘紅皮 白酒半夏

述小腹之右。入暮有形如梗。按之而痛。此為疝瘕。肝病乃
濁陰凝聚。必犯胃氣。大半夏湯有去痰扶胃之功。必加泄
濁和肝。勿令致脹滿。

人參 茯苓 炒小茴香 青木香 半夏 炒橘核
脈沉。湯飲食物。嘔吐吞酸。胸高腹脹。二便不爽。濁氣上阻。
柔溫宣通。

熟半夏

白蔻仁

新會皮

藿梗

生薑汁

大杏仁

紫厚朴

茯苓皮

脈微

小而遲久。食物不進。形色枯悴。畏寒。此為無陽。延久

成脹。

人參

熟附子

生益智仁

茯苓

炒乾薑

左脈獨弦。

臍突筋青。肝脹顯然。脾愈虛。肝愈寔。又不合實。

脾治肝之法。先泄肝。

郁李仁

柏子仁

茯苓皮

炒烏梅

炒桃仁

赤芍藥

薏米仁

由食冷。腕脹。漉泄。漸漸目眩。神疲。筋縱。脚弱。陰陽日衰。前

進薛氏腎氣丸。相投。今夏月土衰木侮。必兼理陽宣通。不

致濁陰結聚。脹滿矣。人參 乾薑 茯苓 枳實

淡附子

水泛丸。晚服。

早上仍用薛氏腎氣丸。

腹右有形為聚。脈大。食入即脹。治在六腑。香附生磨汁。

枳果 白朮 茯苓 三稜 厚朴 南查肉 廣皮

飯微遲。左脇宿痞。漸腹脹。便溺少。明係濁陰上攻。當與通

陽。製附子 炒茴香 茯苓 枳目 澤瀉 遠志

時病食復。至今不知饑飽。大便不爽。右脇之傍。虛里天樞。

隱。有形。此陽胃絡經行之所。多噎氣。食不化。並不煩渴。

已非攻下急驟實熱之症。先用 丹溪小溫中丸。

據述上年秋痢。剗峻攻。逐病愈。不能復元。自小腹膜脹。漸

延中部。按之仍軟。此真氣不收。法當溫養奇經。使元海壯

而病却。瘕茸斑龍丸法加茴香 夜服資生丸去連

夏秋痢疾。是時令溫熱邪未清。與即食腥味。致脾胃受傷。

舌膩白胎。食減無味。氣墜足腫。久久延成中滿也。但數月
久病。旦晚未能奏功。

便秘

生於朮 廣皮 生益智仁 茯苓 厚朴 生砂仁
三陽結乃成腸。先用更衣丸三錢。破小腸之結。後服煎方。

枇杷葉 桃仁 製半夏 柏子仁 薑仁 杏仁

欝金 桔梗

高年陰結。半硫丸三錢。分兩次。人參一錢。煎湯送下。
食入不化。腹脹便溲不爽。長夏濕着脾胃。葷酒不忌。氣分
鬱滯。據述嗔怒致此。未必皆然。茵陳 炒菓 木通

腹皮 飛滑石 厚朴 茯苓皮 廣皮

瘡愈食腥太早。脾陽不司健氣。鬱不行。為腫為脹。宜忌食

物中之粘膩者味者。

小溫中丸三錢 十服

十數方案

○痰飲喘咳水氣腫脹門
昔肥今瘦為痰病傷正氣不復下焦無力議治脾腎。

補骨脂 茯苓 廣皮 生智仁 生白朮 川楝

蒸餅為丸

少陰氣逆議通太陽。

川桂枝 五味 白芍 茯苓 炙草 淡甘薑

乾

少年背冷夜喘此為伏飲成哮。痰飲屬陰邪。乘夜陽不用
事竊發以辛甘淡微通其陽。

桂枝 炙艸 米仁 茯苓 薑皮

飲酒便滑胃中氣逆陽不運行痰聚當以溫通其陽。

生智仁 半夏 乾薑 茯苓 廣皮 薑汁

飲酒聚濕。濕生痰。生熱。維脈為濕熱所阻。遂為痺痛。猶是淺近之恙。其在裏久。釀痰飲。深處絡中。二年以來。陽氣日衰。痰濕皆屬陰濁。藥夜衝舉。有妨卧寢。仲景論飲非一總。以外飲治脾。內飲治腎。為要法。總之脾陽鼓運。水穀之氣。何以化濕。變痰。腎陽潛藏。斯水液無從上泛。而為痰喘。試以過飲必瀉。甚酒肉當禁忌矣。先議越脾法。宣上鬱熱。以通痰飲。

桂枝木 木防己 茯苓 淡乾薑 石膏

白芍 北味

脈沉背寒。咳嗽吐稀涎。夜不得卧。此為伏飲。遇冷即發。

小青龍湯去麻辛

六旬又五從未生育。先天坎陽未旺。所賴後天水穀精華。藉以形充氣沛。男年八八。天癸向衰。形體似壯。其氣已弱。向來味厚溫補。與體質相宜。近因痰多火動。藥力未能收納。及下。反為助痰妨胃之累。虛風暗旋。原非客感。冬藏未富。春木蠢動。風來肝腎。陰陽不交。使然。木必凌土。而納食不化。陡然便澹矣。再論痰飲。莫詳仲景。由水液上泛者。治腎。食減不運者。治脾。今肝木生風。致麻痺漸興。亦當培土制木。早服四斤丸。夜服茯苓飲。痰飲一症。頭緒甚多。以陽氣不足之體。當此天暖發泄。反誤服苦辛泄氣之藥。傷及胃口。此皆冷不能納食。是其明徵。茯苓 桂枝 甘州 生薑 南棗

痰飲皆陰濁。來陽微濁。攻為嘔吐。胃氣傷。不主納食。用真武湯。驅濁飲。醒陽。真武湯。蝦濡。中宮陽不主運濕濁。聚痰不。饑不渴不食。

桂枝木 草果 廣皮 茯苓 厚朴 炒穀芽

高年久不更衣。痰氣上室。滾痰丸

涎飲激射。塊苓 蘊子 陳皮 鬱金 半夏 芥子薑汁

聚飲膈上。早開痰降而已。塊苓 桂枝 炒熟半夏

薑汁 炒橘紅 澤瀉 蘇子

冷哮喘急數年。根深沉痼。發時以開太陽逐飲。平昔用腎氣丸加沉香。

幼年哮喘。是寒暄失時。食味不調。致飲邪聚絡。凡有內外

感觸必喘逆氣填胃臆。夜坐不得卧息。晝日稍可展舒。濁沫稀涎必變濃痰。斯病勢自緩發于林深冬月。蓋飲為陽邪。乘天氣下降。地中之陽未生。人身藏陽未旺。所伏飲邪與外涼相召而竊發矣。然伏于絡脈之中。任行發散。攻表發透。逐裡溫補。與邪無干。久藥不效。謂此治法。宜夏月陰氣在內時候。灸灸肺俞等穴。更安靜護養百日。一交林分。煖護背部。勿得懈弛。病發之時。暫用湯藥。三四日即止。平昔食物尤宜謹慎。再經寒暑陶溶。可冀宿患之安。發時背冷氣寒。宜用開太陽逐飲。青龍法。寒天痰嗽。乃陽氣微弱。不能護衛。風冷未侵而起。久則飲泛上逆。入暮為劇。飲屬陰濁耳。仍發散清肺。倣仲景飲門

議治。

桂枝

五味

杏仁

茯苓

炙甘草

乾薑

附方

橘半枳朮用竹瀝薑汁泛丸。

脈弦脊骨中冷。深夜痰升欲坐。少陰寒飲上泛。議通太陽。

桂苓五味甘草湯加淡乾薑北細辛。

痰飲入夜上泛。喘咳不得卧息。當治飲。不當治欬。

桂苓五味甘草湯加淡乾薑白芍。

寒熱客邪已過。營衛變為痰飲。遇冷遇暖。或加勞悴。飲泛阻塞升降。喘不得看枕。飲去便安。逐飲非一。最難除根。

小青龍去麻辛

久遺下虛。冬欬甚。氣衝入夜上逆。欲坐不安。能枕。形寒足冷。顯然水泛為痰沫。當從內飲門治。醫用肺藥。則謬矣。

桂苓五味甘州湯加白芍乾薑。

壯年久寓閩越粵南方陽氣偏洩中年以來內聚痰飲交冬背冷喘嗽必吐痰胃脘始爽今六十四歲已屬向衰喜暖怕寒陽虛已露不宜搜逐攻劫當養少陰腎藏仿前輩水泛化痰阻氣以致喘嗽之例。

腎氣去牛膝肉桂加沉香五味子。

年老水入湧出陽微伏飲大半夏湯加薑汁

溫邪挾飲上逆肺胃不主宣降欬逆身熱肢脇痺而不舒素有肝邪升多降少以理氣泄飲為治。

旋覆花 薤仁霜 橘紅 杏仁 冬瓜皮 蘇子

左癱經年形體已少矯捷運動長夏氣交之濕與水穀不

運之濕。皆令阻遏。脾胃流暢之氣。食減不化。大便不爽。漸
漸喘急。四末肌理。有中滿之累。杏仁 腹皮 厚朴

米仁 茯苓皮 桔梗 寇仁 廣皮 煎藥送服保和丸

通泄肺氣。喘緩腫減。偏右則知內因水穀之濕。全在氣分
流通而解。凡腥濁厚味。皆滯氣。留着與此病未合。

木防已 苓皮 車蘼 桂枝 米仁 厚朴

老年陽微氣窒。浮腫當通腑陽。勿進破氣。

生於朮 淡附子 川桂枝 厚朴 白茯苓

長夏濕邪傷太陰脾陽。發瘡不盡其氣。浮腫腹脹。議宣通
腑氣。生白朮 大腹皮 厚朴 生牡蠣 茯苓皮

澤瀉 廣皮 木防已

診脈左沉右弦虛。過勞陽傷。清氣不主流行。溫中丸不應。
非有形之滯。以辛溫微通其陽。桂枝韭白湯。
又案。形盛氣衰。是陽虛。平素多飲酒。有濕有痰。其筋骨
中漸漸畏寒刺痛。却主陽氣不流行矣。同前方。

十數老人方案

脾胃門

長齋數年。脾胃日弱。食進腕中少運。小波入暮漸多。色萎黃。脈弦虛。皆中氣不足。香砂異功散。水泛為丸。嘔瀉都令胃氣受傷。凡不適意食物。更能妨胃。藥用和中。謹慎口腹。使脾胃氣壯。不致反覆。

茯苓飲去元參。金石斛湯泛丸。

形勞嗜飲。中氣受傷。涼藥治肺。清痰降火。不過見病治病。急急理胃土以生金。米仁 白芨 黃芪 桔梗 茯苓
素嗜酸者。中氣不利。治以此法。

粗桂木 炒陳皮 焦白朮 白豆蔻 炙黑甘草

舌白滑。微嘔自利。陽微虛餒。急當溫裏。人參 生於木

炮薑 炙草 淡附子 生益智 接服 生白朮

人參 茯苓 生益智 淡附子 炒芍 炮薑

又服六君子湯 丸方 生於木 人參 木瓜

茯苓 生益智 炮薑 陳皮 用煨薑南棗肉煎湯

饑飽失節為內傷。山嵐瘴癘是外因。六腑陽氣不通滯濁

蘊蓄不清。經年不愈。非湯藥所宜。生茅朮 草果仁

厚朴 製軍 廣皮 薄桂心 水泛為丸

脈左小滿右弦。六旬有六。陽微肢冷。腕痞不易運化。大便

三四日一更衣。初結後瀉。此太陰脾陽受困。當用溫中醒

陽。理中加桂湯

溫伏皆令脾胃受傷。寒熱隨利黃水。小便短赤。熱自濕中而出。痛擾虛里。右脇食入不運。仍是脾胃不和。升降失司。以溫胃宣通治。生於朮 生智仁 新會皮 茯苓

紫厚朴 生薑渣

平昔飲酒。脾陽受傷。聚濕食少不化。大便久澹。哺食不安。飲水多。溲溺愈少。宜溫中佐運。厚味酒醴須忌。

生於朮 杜蠟 附子 澤瀉

饑飽寒熱用力。都傷營衛。內應脾胃。故痿黃無力。食入腹脹澹泄。平胃加炒黑川椒。艸果。

茹素多年。中焦陽氣易虧。納食必胸脘痛及兩脇。由乎脾臟陽弱。不主運行矣。治以辛香溫煖。健脾佐運。

於朮 藁朮 淡乾薑 新會皮 益智仁 淡吳萸
夏秋濕勝滯脾。食物不為運化。陽不流行。濕滯久而壅熱。
此中氣更困。以和胃健脾。分利水道。逐濕。

生白朮 草果仁 木通 茵陳 澤瀉 厚朴

茯苓皮 新會皮

酒勝于穀。致形畏寒。嗽不止。咳甚嘔吐。乃胃陽受傷。此治
嗽清寒難用。

茯苓 半麴 煨薑 米仁 新會皮 南棗

胃陽不旺。晚暮腹鳴痞脹。晨起痼泄。兩方用胃苓治中相
安。今吐沫上湧。仍屬胃病。人參 生於朮 茯苓

益智 附子 乾薑 各為末。水泛丸。

凡滋味食下不安。嘔出臭濁不變。蓋在地之物。假梁肉成形者。皆陰類也。宜食飛翔之鳥。以無油膘滯膩。藥用妙香散。芳香醒脾。不致燥烈傷腎。 人參 茯苓 石菖蒲

益智 茯神 炙甘草 檀香 或用木香新會皮 奔馳勞動。搖精腐溺。濁。繼出血筋。真陰大泄于下。胸膈痞悶。不饑不食。腹內响動。攻觸。清陽結閉于上。由醫者不察陰陽虛實。反以清降滋陰。傷及胃中之陽。

人參 穀芽 生益智 石菖蒲 茯苓 廣木香

茯神 石斛 檀香末 廣皮 服十劑後。轉斑龍丸。

食入脘脹且痛。是胃陽受傷。凡冷濁肥膩。須戒。

藿香 枳果 茵陳 廣皮 厚朴 茯苓皮

向係積勞傷陽。肝風內動。症如類中。當以溫腎補脾。運痰
熄風。得効。丁巳春深。診脈不附骨而洞泄。迄今形瘦未復。
頻年久瀉。法宗瀉久傷腎。以固攝下焦。定議六君子湯。仍
宜暮服。勿間。以胃氣弱。陽微嘔酸。

吳萸 乾薑 葫蘆芭 茯苓 車撥 南棗

食入惡心。痞脹。先曾腹痛瀉下。外因口鼻受邪。宜正氣平
胃。辛香久則脾胃陽傷。溫中宜佐宣通。可使病愈。

附子 廣皮 茯苓 草果 厚朴 煨木香

胃口弱極。肛墜如欲頻便。夫腎為胃關。皆腎虛不司收納。
元海氣逆。水化痰飲矣。早上用八味減桂加五味以收腎
氣。散越午後服異功健中安胃。都氣丸四服。

十歌方案

脇腹中諸痛門

心胃痛

饑飽悲哀內傷情志痛無定所忽閉忽開主手營衛流行失緒凡心主營肺主衛當開爽怡悅氣血不致結痺不必偏於寒熱補瀉也桂枝石菖蒲遠志肉荻苓

炙甘草 茯神

腹脹滿渴

消渴心嘈心下痛氣塞自下而上咽中堵塞此厥陰肝陽升舉勞怒動陽必發久則反胃欲厥

阿膠 柏仁 天冬 小生地 女貞子 茯神

肝厥心痛

脈左瀉伏右弦嘔吐腕痛引及脇肘痛甚則四肢冷麻是肝厥心痛驚起拂鬱致痛高良薑 沙延胡 吳萸

婦葉莊方案

胃脇腹中諸痛

肝厥犯胃

青皮子 生香附 川棟子 茯苓 接服蘇合香丸。

真川椒 烏梅肉 泡湯化服。

接服脈伏者起似宜病減而痛脹脘痞口湧涎沫舌仍白。鼻竅煤面欲赤頭汗顯然肝厥犯胃左升之氣逆亂攻絡。脇肱乳穴皆脹辛香開氣不應便秘溺少用河間金鈴子散佐以潤液兩通氣血。川棟子 青橘葉 左牡蠣

延胡索 炒桃仁 漏蘆

病久緒繁終不離乎厥陰一藏。今商佐金氣以暗制之滋營氣以撫綏之實太陰以漸禦之亦子貢存魯霸越滅吳之意。人參 製首烏 茯神 羚羊角 阿膠 麥冬 補肝法。人參 茯神 歸身 炒白芍 柏仁 炙草

又方。
桂枝。

人參

茯神

廣皮

天麻

蒸於朮

炙艸

鈎藤

附方

戊巳湯

砂仁湯

法丸

丸方

鹽水炒

川連

炒黑

川椒

生白朮

青皮

川棟子肉

淡乾薑

當歸身

細辛

脈沉小

左弦

衝氣至

咽欲厥

下墜入

前陰

溲溺不

能自利。

厥陰衝
逆

此厥陰

衝脈至

病當以

穢藥驅

濁。

桂枝

韭白

茴香

川棟

茯苓皮

青木香

肝厥胃
厥當心
而痛

素有肝

厥痛氣

從脇腹

厥逆至

咽胸痛

微背且

多痰飲

舌

苔常垢

白病發

不饑不

食嘔酸

症已數

年痼疾

難効。

人參

炒焦

白朮

茯苓

製半夏

炙甘草

陳皮

炒焦

當歸

烏梅

肉桂心

炒川椒

肝陽犯胃

肝胃痛

病從少腹右痛寒熱嘔吐是肝病傳胃病去不復寢食未
如昔二氣不復摠屬虛象議治厥陰陽明和陽益陰法

小麥 石決明 阿膠 南棗 生地 炙甘草

連朝陰晦陽氣鬱勃食入運化失司氣滯為痛性更躁動
木未乘土况有血症卒血動絡非宜主兩和肝胃

生白芍 延胡索 神麴 炒枳實 廣皮 炒山查

用甘藥嘔緩都因治嗽苦辛寒傷胃衝脈亦陽明胃經骨
轄此補胃以寧衝陽實具至理 川桂枝 炙甘草

生黃芪 生白芍 南棗肉 生牡蠣

嘔吐清水必在早晨蓋竟夜未進食物胃空則陽中濁壅
攻胃胃底之水上溢此病已八年是食不謹慎胃陽受傷

矣。淡吳黃 熟附子 塊茯苓 生白芍

老人胃弱多食甜物緩中。况入暴冷亦走胃之募原湯水盡嘔胃脘痛氣逆格拒以辛香開之。吳黃 高良薑

紅豆蔻 塊茯苓 熟半夏 研入蘓合丸

寒自口鼻中入內發散疏表非法便燥不爽腑氣不和當

先治痛理氣。生香附汁 草果仁 杏仁 高良薑

廣皮 厚朴

丁巳風木不及春半陽未生旺議養陽方法。

人參 熟於朮 生智仁 茯苓 廣皮 乾薑

食入涎湧脘脇痛脹在右邊近日天冷更加前議胃陽已傷濁沫凝涎壅於胃脘致濁氣不降腸中為痺古稱九竅

不和。顯然。腑病。想。暴寒。口鼻吸入。近日反痛。為新寒凝滯之象。蘇合香丸。

辛香。頗通知。通日。吸受寒感。與久蓄凝滯互結。以六日始更衣論。無形與有形交混。不獨輕劑理陽矣。

草撥 半夏 廣皮白 良薑 茯苓 妙香丸

五年來。饑飽失和。膈中胃脘。啾唧痛甚。嘔吐清水。顯然中焦陽傷。但久痛不已。必致凝滯沉錮。自述泄氣。則緩病痛之根。在乎腑絡。

半夏 厚朴 草果 薑汁 廣皮 葫蘆芭

勞怒。脘痛。是肝木乘土。屢經發作。脘聚痰痰。上湧下泄。去始緩。但痛發。徒補則壅。議冬月用通補方。胃屬腑。腑通。

為補。製半夏 廣皮 桂木 茯苓 生於朮

石菖蒲 牛肉膠為丸

心下高脹至少腹其形橫梗大便不與咽中痰阻從九竅不和屬胃虛。小溫中丸十服食不得化。是無陽也。蓋胃陽受傷。陰濁上僭為脹為嘔而酸水痰涎都因陰濁通陽為正治法。

人參 半夏 附子 茯苓 乾薑

胃氣痛發。五靈脂 川棟子 桂木 生蒲黃

元胡索 生香附 痛緩用後方。炒桃仁 茯苓

炒杞子 柏子仁 桂圓肉 新絳

丁巳風木司天春木氣震。胃土受侮。噯氣嘔食。上年多以

半通得効。陽氣因病致傷。姑以小半夏湯和胃。佐吳茱萸
驅濁。半夏 茯苓 乾薑 吳茱萸

四年。臂左有形閃動。發必堅大。膏裏欲束縛。不飢不欲食。
仿金匱桂薑苓朮湯。轉旋下焦之陽。

始而嘈雜。食進不化。數年前。脘中漸痛微嘔。此乃積勞傷
及營絡。絡虛為痛。安閑怡悅。可以少發藥餌。攻病未必去
根。炒桃仁 桂枝木 桂圓肉 歸鬚

炒延胡 茯神

病着右腹。甚至針刺刀割。牽引入于膏背。必泄濁氣。病緩。
自述服蚌灰小效。復發。夫蚌係介屬。味鹹堅。攻直入至陰
之界。是病已在陰絡。錮結痰滯。蚌但鹹寒。不能宣透痰腐。

絡病在下屬血。緩攻為是。

麝香 炒桃仁 酒大黃 熬膏為丸 麝香

陰中之陽失護。痛由前至肋引經。必用厥陰陽明。是謂知
醫。 淡苳蓉 枸杞子 茯苓 沙苑蒺藜 當歸

主精羊肉

陰氣混陽。厥陰病難治。 吳茱萸 川椒 川棟子

乾薑 烏梅 元胡

背脊痛不耐坐。左脇板實。吸氣噎痛。左手冰冷。食入不化。
常有遺精。久病。三年在絡。議甘溫氣劑。

川桂枝木 肉桂 當歸 茯苓 左牡蠣 炙甘草

虛里穴為陽明胃。陽明氣血皆多。絡脈窒塞為痛。映及背

部。脈絡不和。必宣通望其痛息。彼黃地之凝。芪朮之守。皆
非絡藥。桃仁 穿山甲 阿魏 歸鬚 並白根
先有血淋。淋止脇痛。脈來左部堅搏。是少陽鬱熱。藥絡所
致。忌食酒肉厚味。炒熟桃仁 羌蔚子 牡丹皮

當歸鬚 山梔 澤蘭

脈沉小。痛起膏肓。串及腰背。五年宿恙。寢食不改。此病在
脈。腠之間。痺阻不傷藏腑。議以流通周行氣血。勿得峻劑。

川桂枝 撫芎 乳香 薑黃 香附 茯苓 酒洗各半

絡氣不通。嫩蘇梗 黃蔴骨 塊茯苓 煨葛根

左脇下硬。忽忽喜忘。是為蓄血之象。桃仁 牡丹皮

鬱金 鈎藤 降香汁 赤芍藥 橘紅

十報方集

氣痺膈關格呃逆門

中年以後陽氣已微。午時受氣。食納上泛。皆胃弱氣逆。視面明脈弦。必伏痰飲。仲景胃虛客氣上逆例。

旋覆代赭湯

氣鬱四年。脘結自能排遣。其結聚已散。近日喉間吐咯。不消食。味甘必滯。臟是肺胃不降。以微辛微苦之屬。久恙勿投峻劑。枇杷葉 米仁 茯苓 川貝母 金石斛

橘紅 白蔻仁 桔梗 蜜丸

喉旁左右有形。嚥物不礙。但畧起未食。其形為虐。思未食時。胃中陽皆上蒸。犯肺矣。從前致病。以火酒大辛。熱結氣

瘰癧五年。已為痼疾矣。甜北沙參 生黃芪 麥冬

甜煉梨 金銀花 熬膏服

清肺胃化生津液。玉女匭 附方葦莖合葶藶大棗湯

附方 蘆根 滑石 浙苓 生米仁 川貝 桑葉

附方 黃芪 白芨 桔梗 黃精 米仁 百合

聲嘶喉噎。食不適即嘔逆。倉逆。自述飲酒致傷。首先犯肺。

開氣理逆。清肅上焦。鮮枇杷葉 薏米仁 射干

活水蘆根 浙苓 降香汁

脈症乃氣結在上。津不運行。蒸變濁痰。由無形漸變有形。

徐之才謂輕可去實。非膠固陰藥所宜。鮮枇杷葉汁

杏仁 紫厚朴 白蔻仁 薏米仁 降香汁

脈小濡面赤目黃。喉痛咽物不礙。溺後淋濁。此水穀之氣。凝聚成濕鬱。氣不升降。三焦不利。當以清肅上焦主治。

蘆根

射干

朱仁

白菟

浙苓

通艸

昔年強壯。夏極熱病。煩減。精未不復。異竅不通。左脇有聲。攻觸痛嘔。遇勞即發。必脈絡中瘀。留凝聚。煩然食減少。飢大絡必聚血。病中衄血已見一斑矣。生蒲黃 桃仁

歸鬚

五靈脂

穿山甲

桂枝木

韭白汁 泛為丸

此跌撲致經脈氣血壅痺。脇背高凸。非湯藥可效。

黎洞丸 每日服一丸

脈虛浮。沉取直上下行。胃納素減。病發從背徹心。先脹悶。幾日氣遂從下焦直衝至咽。手足厥逆發呃。細測病源。屬

胃虛相火直衝清道而上也。夫衝脈並少陰之經，行乎幽門通谷，夾巨關而上。故丹溪謂呃逆屬于肝腎之虛者，其氣必從臍下直衝上出于口，斷續作聲。右腎為相火所寓，相火炎上，挾其衝氣，乃能逆上為呃。主以大補陰丸折火滋水，伏藏衝任，治虛呃用參朮湯，芡土以制龍雷之火也。至東垣之論，又云胃為衝脈所逆而反上行，其症氣上衝咽不得息，名曰厥逆，宜調中益氣湯加吳萸，觀厥氣多少而用之。且隨四時寒熱溫涼而治。若夏月有此症，為大熱，宜加連藥知母，直至下元以瀉衝脈之邪也。兩條治法，并并高出千古。今擬大補陰丸早服，調中益氣午服，恪守勿懈，自可除根，遠勝後人龐雜之方矣。

大補陰丸 調中益氣湯 秋冬去連藥知母

黃蘗 熟地 人參 柴胡 木香 吳茱萸

黃柏 知母 元武 白朮 炙艸 陳皮 黃連

右少腹中衝氣上至胃口痛而嘔欲呃此陽微陰濁上踞。老人有關格之累。

炮黑附子 淡吳茱萸 生淡乾薑 雄豬膽汁接後藥案

陰濁得辛熱反佐苦寒而降陽明之陽必傷然腑藥以通

為補須忌食物厚味。人參 製附子 茯苓 淡乾薑

形寒嘔逆。痠痛上衝噎食稍減。

人參 半夏 吳茱萸 茯苓 高良薑

右脈如控弦。北種子 半夏 代赭 生枳實 淡薑

茯苓 新會皮 鬱金

惡心飢不能食。旋覆花 人參 雲苓 金石斛

代赭石 半夏 廣皮 薑汁 接服六君子法甘草

附方 枇杷葉 金石斛 竹瀝 橘紅 鮮蘆根

薑汁 後去竹瀝薑汁加杏仁紫苑。

老人脈右弦左濡。因嗅怒致嘔吐。膜脹不納物。此肝木犯胃。湧逆不已。必致濁阻。上下不通。老年復慮。關格。

開口吳。萊菔。薑汁。燉南棗肉。搗丸。服六七分。日三服。

平昔嗜酒。肺胃積熱。陰液下枯。陽津變痰。鼻塞多噎。減食無味。旬日更衣。糞如羊屎。老人關格。治之極難。况酒客不喜粘膩。甘柔形脈。症象不受溫熱。議以鐵甕申先生瓊玉。

血枯腸

陽結屬

減蜜方法。鮮生地 人參 水一盞 煎至四分。臨服加入沉香末。琥珀末。

清陽不主轉旋。強納不運。吐出。是不化之形。腸汁乾涸。腑陽不得傳導。便難艱滯。古稱閤格。為陰枯陽結。藥難奏效。或以半硫丸宣濁通腑。仿戴元禮諸熱藥皆固秘。惟硫黃滑而不秘。半硫丸

氣屬

六旬外。陽氣不旋。反閉。上不納食。下不更衣。此為閤格。脈小結滯。傷于無形。最為難治。

妙香丸 每日三粒 十服 按後藥案

大凡噎格反胃。老年閉于胃脘之上。是清陽不主轉旋。乃無形之結。辛香通關。反覺熱悶上升。虛症無疑。以大半夏湯合加黃連合瀉心法。

人參 半夏 茯苓 川連 竹瀝 薑汁

擬漸磨運蕩之法庶幾得之
欝金汁 檀香汁 川貝

瓜蒌皮 梨半夏 沉香汁 枳實汁 塊茯苓

瓜蒌皮 製半夏 沉香汁 枳實汁 塊茯苓
先吐污濁。繼而氣逆吐食。平日腹痛。今已。便難。痰留在絡。
氣亂道路不通。有形阻及無形。議攻其痰。

桃仁 製軍 去枝桂枝 延胡 生蒲黃

炒烟盡五靈脂 韭白汁 臨服冲入三十匙

炒烟盡五靈脂 韭白汁 臨服冲入三十匙
疑痰既久三焦道路為壅延成反胃噎膈緩一法。

人參研 苑仁去脆皮 麝香研 大黃 麝虫酒浸焙脆

當歸稍烘煉蜜為丸

中焦痰
服

經云。食下不化。是無陽也。今早納晚吐。仍然完穀。胃陽衰
憊。困窮。反胃湧吐。陽氣結痺。濁陰壅遏。况少壯至中年。操
持繁思。喜飲少穀。陽氣積傷。虞花有云。格拒反胃。必陰枯
陽結。視面赤屬飲。脈弦為痰。飲留氣凝。焉得不痛。緩痛宜
通。然非攻下蕩滌之比。當從通陽鎮逆為法。真寒辛酸破。
洩真氣。大傷胃陽。不可再服。倣仲景胃虛客氣上逆例。

酒腸

人參 淡附子 淡乾薑 代赭 塊苓 白旋覆花

酒熱傷胃。穀食入脘。即噎湧出涎沫。陽明脈不用事。筋脈
牽絆。與半夏瀉心湯。

半夏 茯苓 金石斛 竹瀝 薑汁

接服 杏仁 鮮枇杷葉 厚朴 茯苓 半夏

上脘

右脈弦長而數。左脈帶濡。阻在胃之上脘。起自恚怒。不獨傷肝。肺亦有之。何也。以其循胃上膈。是肺之所屬。金不及木。得反侮之。聚則氣凝。痰阻。眼胞足以證之。擬泄金平木。何如。薑製枇杷葉 蘇子 水梨汁 醋製代赭石

苑仁

茯苓

薑汁

鬱金

滑石

絳絹

三四寸煎湯代水

中脘

半硫通下頗效。妙香開上反吐。此中焦胃陽已虛也。用大半夏湯。

中脘

食不得化。是無陽也。脈絡映痛。辛香芳溫可效。當用

蘇合香丸

上脘

昔年嗜飲濕聚痰壅。致清升濁降。痺阻食脘窄隘。噯竅不納。飲留氣凝。治在上焦。以飲有質。氣無形也。生滑石

紫厚朴 竹瀝冲 蘆根 瓜蒌皮 薑汁冲

老人噎膈。不能納穀。脫中窄隘。是氣不通。非有餘之比。

枇杷葉 米仁 橘紅 蘆根 茯苓 薑汁

途次吸入寒氣。傷及絡脈。每胸痛飲熱酒。宣通小愈。中年屢發。陽受傷。必有瘀聚。漫延反胃。噎膈宜薄味節勞。

薑汁 茯苓 炒桃仁 桂枝木 半夏 胡索

附方 早服淡豆腐漿 晚服枇杷葉膏

噎膈為患。脈微而遲。乃胃之冲和之氣。曲運神機所致也。今已顆粒不食。呃逆不止。倉廩頓憊之象。

人參 茯苓 陳皮 枳實 生朮 炙甘草 半夏

磨冲。絞銀汁和入服。

內經無火無水之論原非泛指張子和亦云湯中煮桂火裡燒薑豈不續耶 蘆根 生地 塊苓 米仁 生朮

枇杷葉 竹茹 鬱金 代赭石

又接服 六君子去甘艸加 枳實 代赭 薑棗 黃米

脈右弦面色赤亮納穀咽乾腕阻碍不下五十四歲清陽日薄致轉旋日鈍痰必阻氣結則腕窄不能宣通耳大便仍利但治腕膈之上

白蔻仁 杏仁 厚朴 桔梗 枳實 半夏

半年腕悶多噎效嗽此氣鬱不解納穀已減破洩耗氣非宜從膏痞治 薤白湯

掃葉莊一熟老人方案卷三

廿數方案

臨

瘡疾門

薛雪生白著

無錫
蕭山謝誦揚

瘡母因不慎食物。腹鳴。痞脹。滯泄。以理脾胃之陽藥。

枳果仁 吳茱萸 茅朮 厚朴 廣皮 枳目

老薑搗取汁。泛為丸。

舌白不渴。脈沉。腹滿。不飢不食。二便不通。是暑濕發瘡後。

中氣不復。驟食大葷。亦氣結成脹。

大針砂丸一錢二分 十服

脈左數搏。是先天真陰難充。則生內熱。瘡熱再傷其陰。與

滋養甘藥填陰。左歸丸去杞子牛膝加 天冬女貞

三瘡乃邪伏陰分而發。數月始止。然畏風怕冷。因瘡邪偏

掃葉莊方案 瘡疾

廿五

寒偏熱已久營衛皆弱氣薄不固調養失宜必致復病議
用大封大固如天真丸。天真丸去羊肉加河車膠
向來多嗽肺傷六月廿四風潮感邪卑熱不寒為瘧瘧仲
景謂消燥肌肉當以飲食消息之在手救胃陰以供肺也
醫知是理否。大竹葉 連翹 麥冬 生甘州

青甘蔗漿 甜秋梨漿

伏暑因新涼發瘧頭脹惡心腕痞邪鬱上焦從肺瘧治。

竹葉 連翹 滑石 杏仁 川貝 橘紅 白龜 紫厚朴

太陰濕瘧脾陽傷氣不運舌白腕闕水飲停蓄當理氣分。

草果 厚朴 藿梗 廣皮 杏仁 苓皮 化藜合丸

濕熱未清瘧止頭目昏中不爽不飢不思食病在氣分。

草果 白蔻 厚朴 廣皮 茯苓 杏仁

痺癰兩旬不解舌白腕悶色奪。（接服竹葉地黃湯法）

葛蒲根汁 白蔻仁 草果 厚朴 杏仁 茯苓皮

廣皮 化牛黃丸（一丸） 一去杏蔻加木香藿香（化公）

間癰不飢心悶不甚渴從脾胃制即可愈

草果 知母 黃芩 生薑 厚朴 半夏 廣皮

風濕着太陰瘡。 草果 厚朴 廣皮 茯苓 猪苓

藿香梗 化藶合香丸

農家夏季受冷濕之氣陽氣不司宣暢壯年形與無力乃

勞倦傷之瘡。 生白朮 生薑 草果 厚朴

廣皮 藿香

培葉莊方案 瘡疾

此熱傷氣分而為瘧瘧寐則肢腫熱渴餘暑尚熾宜救胃

津。人參 麥冬 竹葉 知母 生甘州

瘧止反覆必有所因。姑就色脈氣怯神弱因病致虛。夏秋

宜調中益氣。人參 益智 茯苓 廣皮

炙甘草

今年瘧疾半由雨濕陰晦之邪。當以芳香逐穢理氣分多
效。但三瘧係在陰伏起必左足微冷。熱過有汗。仍知饑知
味。乃勞乏氣怯之病。不必端以攻邪。是歲係濕土司天

桂枝木 生牡蠣 炒黑蜀漆 生芪 當歸

防風根 生薑 大棗 接後藥案

寒在四肢熱起額準至腹此太陰三瘧也。經水來期不移。
脾主營前議和血托邪服後瘧來熱多口渴。此太陰陽明

草果仁 知母 細桂枝尖 黃芩 生薑 烏梅肉
勞倦傷陽不復新。再受為瘡。質虛感邪。不可發散。

桂枝 生木 防己 茯苓皮 藿梗 廣皮

三年前失血。今秋逢次暑濕熱傷成瘡。腕瘡不飢。是邪結
氣分。飛滑石 白蔻仁 杏仁 厚朴 藿香梗

廣皮 木香

今年瘡痢。皆水土濕鬱之氣傷及脾陽。不司轉旋。令人中
痞不食。早香理氣驅濕。疏粥易安。濕土司天

生草果 厚朴 桂枝 茯苓 藿梗 廣皮

數月瘡三日一發。邪伏于陰。不忌葷酒。致脇腹有形。邪與
氣血膠固。結為瘡母癰瘻。鱉甲煎丸 每服三十丸

瘡傷陰氣。復脈去參薑桂。

瘡熱傷陰。不復乾。欬汗出。桑葉 玉竹 炒川貝母

大沙參 麦冬 生草 南花粉

少陰瘡誤治。延及太陰。腹有動氣。近暴冷寒熱甚。

淡附子 川桂枝 北細辛 炙甘草 生薑 南棗

寒自背起。熱不煩渴。不飢不思食。指臂麻木。脈來小弱。近受濕邪。如瘡。其實陽氣久虛。當從本病調折。

川桂枝 茯苓 炙草 煨薑 南棗 生益智仁

背寒肩胛拘束。陽微瘡根。人參 附子 桂枝木

炙甘草 生薑 南棗 生於朮 生益智仁

按案 形寒拘束已止。身痛食少。生黃芪 歸身 人參

南棗 淡附子 蒸冬朮 廣皮 炙甘草

又照前方去淡附子加穀芽煨薑。

熱後寒寒後熱此兩陽遇于一陰如易之離象中宮必虛。大忌散發攻食間日而作瘡勢未罷仍該和解。

鮮荷梗 白蔻仁 黃芩 鬱金 烏梅肉 生白芍

夏秋所伏暑濕至霜降節乃發是新邪引動宿邪初病頭痛汗出寒熱勢猛是新邪鋒芒易解繼而勢似差緩瘡來兩日越一日再發半月竟成三瘡發于子午地支為太陰。蓋邪氣久伏六淫客氣皆從火化然中年形體豐偉已見脈弱神倦外似有餘裏真不足凡寒熱之邪必由四末漸攻中焦病來心中熱躁渴飲胸悶不知飢知味寒則肢背

拘束。熱甚。心腹最劇。由邪聚為重。邪么稍緩。此為裏中之
之表。病在絡。不能振汗。解下奪。惟辛香宣通。以氤氲氣瘴。
原非質滯。阻清陽流行之隧。曰加蒙痺。致正氣日疲。故深
秋入冬。伏邪在陰。發瘧不與時瘧和解清熱同例。

方缺

寒熱過後。從太陰劫瘧。紫厚朴 茯苓皮

川桂枝 草果仁 木防己 天花粉

先有遺精。陰虛瘧邪墜入陰絡。是少陰瘧。非治瘧通套。此
苓可效。

素有遺精。瘧未而遺止。陰中之陽。既因邪得深入。留連述
寒熱起。由足跗蹠。陽經失護。少陰內怯。不得以表裏混治。

人參

歸身

炙草

鹿茸

桂木

生牡蠣

陰瘡上部先寒年十三未出。

是營衛疎客邪留着色黃

脈小。

歸芪建中去錫糖

久瘡營衛皆虛血空氣疎頭暈心悸無以主張先與甘緩

益虛。

生黃芪

茯神

炙草

歸身

米仁

桂圓

瘡母遇勞而發顯然陽傷絡空。

阿魏丸

今年患瘡最多皆因大地濕邪濕傷陽氣不旋肛墜痔血。

小便不利宜旋轉太陽之氣。五苓散

瘡邪傷陰陽升不藏衄血夜汗。

六味去丹澤加五味女貞

附方補中益氣湯加首烏

又首烏

白朮

錢五

又生枝木

龍骨

煨薑

南棗

培葉莊方案

瘡疾

廿九

濕瘡失治。瘡疥腹脹。形寒減食。都是脾胃受傷。勿強進腥
濁厚味。胃苓去甘艸。梓葉。

^按昨服胃苓湯。糞後有血。小渡不利。久伏濕邪。三焦皆受鬱。

久成熟。用分消法。茯苓皮 山茵陳 木防已

紫厚朴 槐花 細木通 海金沙 車蘼

此厥陰瘡症之量重者。煩躁吐衄。脈弦數可徵。擬苦辛酸
法。川連 川椒 桂枝 乾薑 烏梅 白芍

瘡三日一發。是邪伏在陰經。經年雖止。正傷難復。仲景龜
甲煎丸。專以升降宣瘀治肝。謂寒熱不離少陽。久必入肝。
肝主血。左脇為肝募。愈也。故病固當如是。但久有遺精食
少不化諸恙。病非一端。此攻邪溫補。未能却病。莫若養正。

氣旺邪自除。古有諸矣。午服妙香散。

三日瘡是邪伏。陰分而發。非和解可效。久瘡不止。補劑必以升陽引伏。邪至陽分則愈。守補藥則非。人參 鹿茸

當歸 茯苓 附子 鹿角霜 杞子 沙苑

熱病繼瘡。交冬自止。左脇已結瘡。母令食物難化。大便瘡泄。神疲力倦。病由葷酒太早。致濕聚氣阻。治以疏補脾胃。茵陳 四苓 加厚朴 益智仁

十難方業

○夏暑濕熱

診脈緩而濡。胃脘不爽。欲暖。夜來腹脹。吐痰酸水。口臭。吸冷。損及中陽。暫用冷香飲子方。宜緩進參朮。

藿梗 草果仁 附子 廣皮 厚朴 茯苓

脈沉緩。目黃。舌白。嘔惡。脘腹胸脹。此冷暖不和水穀之氣。釀濕太陰脾陽不運。周行氣遂為阻。法當辛香溫脾。宣氣逐濕。用冷香飲子。

草果 藿梗 半夏 茯苓皮 厚朴 廣皮

杏仁 茵陳

舌白黃。不饑。筋骨甚爽。自暑濕內蒸。脾胃受傷。陽明脈

不司分布流行。若不早治。必延瘡痢。

白菟 杏仁 藿梗 木通 滑石 厚朴 廣皮

桔梗

春夏地氣上升。身露山麓。亦有瘴氣混于水土之中。飲食不覺。脾胃氣困。頻年長夏。舌黃腹脹。便秘成瀉。皆濕阻清濁不分。兩年治效多。以分消。每交春深山行蔬食。俾氣清流暢。則無是病。

生白朮 杏仁 廣皮 苓皮 厚朴 生智仁

桔梗 金石斛汁法丸

又煎方。草果 廣皮 腹皮 猪苓 厚朴 苓皮

茅龍子 澤瀉

失藏人身應之患。此者最多。考古人溫病忌表散。誤投則
劫津。逆傳心胞。最怕神昏譫妄。治法以辛甘涼潤為主。蓋
傷寒入足經。溫邪入手經也。上潤則肺降。不致膈鬱胃熱下
移。知饑渴解矣。

嫩竹葉 麥冬 桑葉 蔗漿 石薺 白糖拌炒

高月

生艸 杏仁

冬溫伏邪。先厥後熱。熱深從裡而發。汗出煩渴。當救胃汁。

竹葉心 麥冬 生谷芽 烏梅肉 生艸 川石斛

風溫欬嗽。下焦陰虛。先以辛甘涼劑清上。

桑葉 大沙參 麥冬 玉竹 川貝 生艸 糯米泡湯煎

冬月溫邪內伏。入春寒熱欬嗽。身痛微汗。乃解。與溫瘧。

同法。

桂枝白朮湯

欬嗽二年形瘦穀減。冬季喉垂漸痛。可見水虧。陽氣不藏。春月氣日甚。皆陰之上承。陽結于上。為喉痺矣。近日寒熱風溫客氣。脉小數。為陰傷。忌用辛散。

桑葉

沙參

川貝

玉竹

麥冬

生艸

風溫變熱。燥筋灼骨。足筋腫痛而熱。二便不通。夜躁不眠。邪已入厥陰。多驚駭面青。徑水不應。期而來。為脚氣之症。

漢防己

川黃柏

川草薢

晚蚕沙

海金沙

川通州五錢煎湯代水

鮮生地

阿膠

五味

牡蠣

麦冬

白芍

女貞

脉数右實左弦。服養陰藥已得效。但未能愈耳。嘈雜恍惚。胸上動氣。微苦寒熱。用小柴胡湯治陽維之會。

桑葉

挂霜

赤丹皮

鮮生地

鮮桑葉

阿膠

女貞

生白芍

白丹皮

直

溫邪感觸。氣逆口鼻。宜走膜原中道。不同傷寒陽症。邪自太陽次第傳經。蓋春溫夏熱。鼻受氣則肺受病。口入之氣。竟由腕中。致以手經見症。不似傷寒足六經病也。仲景論溫不可發汗。汗則劫津傷陽。身必灼熱。一逆尚引日。再逆促命期。又云。鼻息鼾。語言難。刺驚為痼痰癰。無非重劫陰陽而然。今病發熱。原不是太陽客邪。見症所投。羌防辛。

溫表汗。此即為逆矣。上竅不納。下竅不便。亦屬常事。必以攻下希圖泄熱。殊不知強汗劫精而傷陽。妄下劫液而亡陰。頃診脉兩手如搖而戰。舌乾燥而無胎。嘴前乾板。目欲瞑。口欲開。周身斑紋隱躍。時有呃逆。因胃乏穀氣而中空。肝陽衝突上冒。聾耳為今迫正。先用糜粥。使胃中得濡。厥陽不致上冒。而神昏之累可已。進藥之理。甘溫可以生津除熱。即斑疹亦不必慮。觀仲景論中。邪少虛多。陰液陽津並涸者。復脉湯主之。今仿此意。

炙艸

生地

阿膠

人參

麦冬

白芍

溫邪有升無降。徑腑氣機交逆。營衛失其常度。為寒熱。胃津日耗。渴飲不饑。陽氣獨行。則頭痛面赤。是皆冬春驟暖。天地

濕病

陰虛濕熱。衛泄。營熱久延不已。最為棘手。擬從心營肺衛治之。

鮮生地 金銀花 桑葉 小麥 鬱金 犀角尖

淡黃芩

伏熱久鬱。營衛失調。汗泄心嘈。皆是內蒸氣弱。肢足稍露。則臍下便痛。正劉氏所謂亢則害。乘乃制之義。

鮮生地 犀角 青蒿梗 生石膏 地骨皮 知母

汗多氣泄。心包伏熱。五心焦煩。形體反惡外寒。投清寒之品。熱勢稍減。但熱蘊于裡。必得水升火降。方能陰陽和快。

犀角尖 浮小麥 鮮石膏 鮮生地 元參心 硃砂 染麥冬

客冬感寒入春化溫寒熱藥不中竅致令汗泄正虛因循難愈議進醎鎮一法。

桑葉 阿膠 茯神 生白芍 牡蠣 炙州

日久寒熱正虛無以主持頻汗泄亟宜固陽攝陰。

生鱉甲 桑葉 阿膠 生芪皮 生白芍 枯苓

茯神 炙草

脉數上出魚際一寸心中熱與背相控。

鮮生地 阿膠 麥冬 九孔石決明 生白芍

女貞子 五味 雞子黃

脉數上出魚際一寸是謂溢脉陰氣不能上承于陽也寒熱汗出身半以上是太陽失陰守非壽徵也議攝陰救陽。

掃葉莊方案

○春溫

過飲酒熱上熾。肺衛心營受迫。旬日間有寒熱。痰飲阻氣。欬逆胸痞。乃內因致病。薄治味以清肅氣分。

蘆根

枇杷葉

桑葉

米仁

浙苓

煎好如生石羔末再煎

溫邪蒸灼津液。釀為熱痰。胃口不得清肅。不飲不食。只宜甘涼生津。峻利不可再投。

麥冬

蔗漿

花粉

嘉慶

川貝

桑葉

大沙參

津潤風動。肢強口噤。溫邪內陷危篤。以甘後生津熄風。望其出音。

炙州

麥冬

阿膠

火麻仁

細生地

蔗漿代水煎

掃葉莊方案

春溫

三五

風溫

高年左癱。近加風溫寒熱。主客皆病。防其昏瘖。

厚朴 廣皮 豆蔻 杏仁 木通 苓皮

溫邪入肺。不解。遂逆傳。膈中煩熱。昏瞤。噎出血沫。猶然氣喘不食。夫肺主氣。心主血。辨症分經。最為要旨。

淡竹葉 阿膠 枯黃芩 六一散

病邪已去。虛熱未除。

生地 玉竹 水梨 生州 麥冬 丹皮 花粉

熱邪久伏。風寒外侵。春溫氣機不藏。內蓄之邪。復新。咳嗽咽痛。兩足畏冷。擬辛涼輕劑。掣其潛伏之邪熱。

桑葉 南沙參 薊金 黑山梔 杏仁 菊花

桔梗 生草

牙斷常紫。蓋疫痛。上年秋季為甚。此濕邪阻于經絡。陽明之氣不司束筋利機。議宣通脈絡之壅。使氣血和平。

金毛脊 白茯苓 生白朮 油松節 生米仁
木防己

過飲晨瀉。中宮留濕。乾嘔腹痛。是脾不和。陽氣不主運行於四末。故四肢無力困頓矣。宜忌濕肉。使清陽轉旋。中宮得健。

草果 厚朴 藿香 廣皮 茯苓 半夏

新沐頭痛鼻塞。狀似風溫。次日寒戰大熱。脇肋痛不可轉側。自利稀水。乃濕聚於經脈。病在氣分。熱渴欲飲水。今日黃上視。手肢痠痠。舌胎白齒板燥。胸中隱痛。皆邪深痼。

變出。

木防己 桂枝木 大豆黃卷 茯苓 天花粉 菖蒲汁
用木防己湯。症厥已後。經脈鬱伏。濕邪已解。胃汁大傷。痰
嗽氣肉。與甘藥不傷胃氣。

甘蔗漿 南花粉 薏苡仁 炒黃川貝 麥冬

夏季水土之濕。口鼻受氣。著於脾胃。潮熱汗出。稍涼。少頃又
熱。病名濕溫。醫但知發散清熱消導。不知濕鬱。不由汗解。舌
白不饑泄瀉。

滑石 白薤仁 茯苓皮 猪苓 通艸 厚朴 澤瀉
冷熱濕穢。雜感太陰。經受邪。

草果 桂枝 茵陳 藿梗 厚朴 防己 茯苓 廣皮

濕鬱氣阻。疹發。飛滑石。茯苓皮。射干。木防已。

茵陳 檳榔摩汁

今年天運寒水。地氣濕土。春夏而濕泛潮。鬱勃穢濁之氣。人在氣交之中。口鼻觸受。直走胃絡募原。分佈上下。如此症初病。頭脹痞悶。嘔惡必舌白。病全在氣分。為裏中之表。芳香逐穢。淡滲逐痰。俾早氣不致外散。此不為僅以陶氏全書方案競進。彼寒分六經。熱犯三焦。不同道也。且醫藥初用。即瀉。暑必挾濕也。消之不降。清之不應。此濕邪。乃是無形。醫治却是有形。今診脈小濡。舌乾口渴。不能湯飲。胸次爽而濡。仍有嘔逆之狀。當溫脾陽以運濕。仍佐辛香。可望其效。草果。桂枝木。茯苓皮。厚朴。廣皮。

木防已

病本濕溫元氣不能載邪外出。勢有直犯神京之狀矣。擬以梔豉上下分開之勢。薑棗左右升降之芳香之草橫解之。

西豆豉

黃芩

鬱金

生香附

黑山梔

甘草

鮮菖蒲 生薑

舌赤頭痛惡心脈大溫邪入募原也。白蔻仁 桔梗

枇杷葉

鮮醒蘭

瓜蒌皮

天花粉

大杏仁

脈右大舌黃不渴嘔吐粘痰神躁語言不清身熱不除此勞倦內傷更感溫邪須防變症。

竹葉

六一散

厚朴

茯苓

白豆蔻

廣皮

暑濕鬱蒸

滑石

竹葉

連翹

淡芩

桑皮

木通

暑風上鬱。陽分盡。日頭痛。鼻淵。鮮荷葉汁。青菊葉。

滑石 羚羊角 連翹 桑葉 銀花

暑風痰嗽。目黃。舌白已退。遇風肌熱。此肺病未和。薄味不致瘡。六一散 川貝母 枯薑根 地骨皮 桑葉

玉竹

形瘦陰虧。暑熱客氣不盡。氣分有熱。故不耐陰柔膩藥。

竹葉 川貝母 麥冬 知母 生甘草

雖是伏暑濕邪。平素陰虛久。積勞倦。病發先有夢遺。此禁芍藥。連苦辛皆忌。鮮生地 連翹心 竹葉心

細木通 六一散 金銀花

舌乾黃。經脈更弱。腕中不爽。熱傷津液。陰不上承。清熱不

應以甘寒生津。

鮮生地

麥門冬

柏子仁

茯神

人參冷冲

伏暑熱燥氣分津化痰形瘦嗽未止不飢便溏。

米仁 蘆根 白菴 浙苓 桔梗 枇杷葉

方 竹葉心 六一散 川貝 生軍 南花粉 桑葉

陰弱之質暑風外襲頭蒙口渴以輕劑肅之。

鮮丝瓜葉 杏仁 連翹 大豆卷 川通草 桑皮

香茹飲泄越滲利顧不宜於虛體或有人參者可以涼服暫用藥當和清暑以而濕已久中宮易困耳。木瓜 扁豆

人參 茯苓 甘州 醒頭草

形瘦液少暑濕泄瀉初愈又咽乾放嗽以暑挾濕秋熱化燥。

乃勝復之理。玉竹 麥門冬 北沙參 生甘草

桑葉 南沙參

神

脈弱無力。心中洞入。夜昏譫語。面目皆紅。煩渴微飲。是勞
倦內傷。頻與苦辛消導。滋陰陽愈傷。則浮越有虛脫之慮。
議用仲景救逆法。生龍骨 炒黑蜀漆 生左牡蠣

炙甘草 川桂枝木 南棗肉

脈弦長入尺而數。舌上沾苔。時或發熱。大便或溏。顯然素
稟陰虛。漫受暑濕。草果仁 金石斛 紫厚朴 鼈甲

廣橘皮 淡竹葉

尊體本陰虛。陽氣并邪。獨發熱。兩旬餘不解。無汗。蓋因枯
液不作汗邪。亦不解也。連劑養陰之後。邪少鬆。則汗大出。

是雲行而施。正。品物咸亨之候。何疑其脫也。但弱。躰久病。不解。元氣愈虧。此邪稍出。大汗作。亦屬接補。闕頭。不可少。懈耳。心靜則氣定。而神住。切不可憂擾神氣。致陽上升。

人參 四錢 熟地黃 一兩 製首烏 五錢 抱木 茯神 二錢

生左牡蠣 六錢 天門冬 三錢

積勞傷陽。哀感動臟。重重內損。夏穰伏邪。已深入重圍。此邪從陰經來。朱漢老非治時邪。知母入咽。即呢。陽明助陽。也。故三陰而施溫補扶正。正謂托邪。知母入咽。即呢。陽明之陽。飢餓不飢。不食不寐。陽不流行。三焦困。脾腎憊矣。肛墜。屬陰氣陷。難任純剛之劑。人參 廉角 當歸身

煨生薑 草果仁 紫厚朴

廉角 當歸身

熱甚心煩躁渴。宜宣腹中熱氣。兼驅伏暑。

清心牛黃丸

辰砂益元散

三錢

竹葉心

二錢

煎湯送下

脾胃氣困鬱蒸為黃痛。乃陽不流行。久病不可純攻。

山茵陳

生益智仁

生白朮

茯苓皮

紫厚朴

廣橘皮

生香附摩汁

痘疹幼科雜治

稔年五疳數年不愈。脾胃愈損。必肝木來乘。已有驚恐筋

牽。皆欲成五癰矣。其腹中冲逆為痛。即木剋土之象。用錢

氏史君子丸。未有大效用。制肝實脾疎腑方。川棟子

厚朴

胡黃連

史君子

黑糖油

生白朮

稔年純陽體質。瘡痢是夏秋暑濕熱病。間述幾年調理都

瑞葉莊方案

春溫 痘疹 幼科雜治

四

以溫補得效。但幼科必推錢仲陽方法。幼穉致傷。全在脾胃。脾陽少運。濕聚泄利。溫煖脾陽。運行去濕。亦屬至理。若骨脂附子溫腎。穉年恐未宜久進。今年太陽寒水司天。太陰濕土在泉。兩濕太過。陽氣最傷。大忌苦寒。暫服方。

錢氏益黃散

附方 乾蟾 川連 白朮 茯苓 青皮 雞內金

人參 鬚 薏米仁 神麴 澤瀉 煉蜜丸 炒米湯下

附驚風方

全蝎 僵蚕 天麻 川黃連 生甘草 膽星

犀牛角 麝香 金箔為衣

掃葉莊一瓢老人方集卷四

一 點老人方集

驚悸
夢遺

。送精淋濁尿血。
。白濁暑主涼來陽降多遺。道。悸。恐。畏。怯。用。交。心。腎。固。

攝。

人參 龍齒 歸身 芡實粉 遠志 柏仁 湖蓮

茯神 熟地 五味子 金櫻子丸

苦寒直降。陰走洩為送。陽浮越為致。痛欬。以。振。固。氣。主之。

熟地 遠志 龍骨 茯苓 芡 牡蠣

陰越傷陰。數年。春秋肉熱。似。出。復。能。食。想。將。可。動。勞。

陽象易于升動。比陽降為送洩。席潛丸

精渴甲年。按述途中煩勞驚恐而。頭面眩暈。肌肉麻痺。

遺精事必汗泄。精及壯。此陽微失護。精關不固。溫腎寧心。其南交合。久恙未能速效。

韭子 龍骨 覆盆子 五味子 菖蒲 柏子仁

補骨脂 胡菴 金櫻膏丸

陰淺為遺。下焦諸脈既空。不主拘束。其陽浮上灼。自有骨
痠。軟。此注脈等。蓋必填實下元。了。合。而慮少年精志未
堅。失于保養。有勞怯內損。

熟地 山藥 芡實 龍骨 龜板 山茱萸 茯苓

五味子 遠志 金櫻膏丸

五泄下洩。陽氣上越。壯感。眩暈頭重。疲弱不耐步趨。正內
經謂下者上實。為厥巔疾也。填精益腎。未常不是。但音

藥未不動氣。氣味未去耳。法當潛入陽。並入陰。質重
味厚。滑滋導引。確守勿懈。可冀其固。

鮮鹿尾一具切片 牛骨髓 羊骨髓俱隔水 猪脊髓去膜

生白朮骨 生白左牡蠣 元武版 生鱉甲 五味子 茯苓

山茱萸 湘蓮 山藥 芡實 方紅青鹽 以髓丸飢時服

前用潛陽填精方。眩厥不至而吸短逆精痿得如昔。有尿精

血未能生旺。今若長夏氣泄。易解穢熱。最宜林泉寂靜。我

亦稍後可立接。前方主急驚。加人參。藏秋石。

淋瀝為濁。凡有得者。名溫熱。不足者。屬精敗而腐。見症厚。左

治以溫養通補。

鮮河車 枸杞子 沙苑蒺藜 溪荪 薏苡 龜地

茯苓 坤身 小帶 赤白帶

遺精白濁。用填陰固精之劑。小波不通。背部要腎。氣擊攻
弱。乃濕熱內鬱。太陽之氣不行。仿金匱渴者用猪苓湯。
今反虛疾。皆時令濕淫之邪。積後食物不慎。濕留生熱。下注
遂患淋瀝。是痛飲難。閱音取苦勝濕。寒勝熱。甚。是近理。但
加地黃汁。膩濁淡血。通利未合。

海金沙 茯苓皮 山茵陳 晚香沙 葛蒲 黃柏 草薢

精濁已久。肝血腎液以損。心熱精自出。先陰也。

二仙加地黃。茯苓。五味。乾骨。遠志。二便。益子。

破傷淋瀝。熱濁。不能寧。忍。用通利。外。送精。腎。氣。急。效。
跌撲必屬驚恐。以致逆亂。以東垣天真丹。緩治。以行旋氣。

血之痺。七旬年歲。下元已衰。淋閉久不肯愈。喜正天寒。會
減。苦味下病。信中。治法非易。靈樞經云。氣不足。波使。利。其。氣。
以知味。知氣。然後議病。大辛及湯。
下。左。淋。閉。柔。劑。溫。通。

杞子 淡菴苦 原角霜 沙苑 鹿膠 巴戟

色奪脈虛。夏秋。日加煩倦。中非。其。病。按。說。左。脇。中。動。氣。
因。送。藥。為。珍。而。乃。下。損。精。血。微。氣。因。精。而。為。常。補。精。化。氣。

紫石英 杞子 製首烏 鹿神 柏子仁 煨身

濁病乃濕熱下注。久而失治。變為精濁。不易速愈。先用丹

清補陰丸一月。再議。大補陰丸。鹽湯送下。

每夢精。腰膝疲。入暮內熱。五更盜汗。交黃。前後。轉。質。

掃葉莊方案

遺精淋濁尿血

四三

又乏。然真陰大虧。陽氣依附。浮動不已。虛怯內傷。若不
養陰。服藥不效。

人參 五味 阿膠 天冬 蓮肉 熟地 茯神

柏子仁 黃芩 金櫻膏丸

尿血即血淋。熱送小腸。膀胱為多。今四肢不溫。膝痠逆冷。天
煖於火烘。脈緩小弱。此小脈不攝。以壯衝任督脈。佐以涼
肝。乃被方之剗劑。

鹿茸 鹿角霜 炒黑杞子 歸身 生地 天冬

~~體~~ 體壯肌豐。脈乃緩小。陽氣於泄。行似有餘。証實不單。水
氣之氣。不為暢達。痰涎下注。乃河已涸。三四十年。不效。氣陰。
宜升陽。為法。非比少壯陰火自灼之病。

美丝子 車前子 蛇床子 大蓟子 韭子 夜苓

覆盆子 覆盆子

送精傷腎。氣不收納。卧倒氣冲上。胸腹脹呼吸不通。竟夕危坐。對浮腫而冷。小便澀少。多非根底。多不記松。難治之症。

腎氣丸去牛膝肉桂

送精多事不食。寐外陽入于陰。溺必自為不禁。寤外於溺不便。送攝因下元不固。疎非升陽。主欲以酸味藥和。至陽氣直升。直降。是為時法。

山茱萸 山藥 金櫻子 五味子 湘蓮 芡實

診脈右數。左小數。入尺淋瀝不止。佳患自疾。是精血損。損肝腎之症。凡孫持用心。五五之火自元。是情志實。起非太氣。淫之邪。並不

瑞葉莊方藥

遺精淋濁尿血

許以清散（率）火為治。

熟地 枸杞 茯苓

及杜子 柏子仁 甘菊

遠志 少薄 系附

脈左弱下重入尺有夢久遠足與虛度。行動氣促似喘。皆
任交虧。衝陽升舉。務以填實精竅。不及僞治。

方解青蒸 炒黑遠志 小茴香 北不灰神 湘蓮

紫衣胡朮

膏淋四年。夏秋但淋入太先兩脇痛。左右橫枝必嘔吐。痛
時溺清。痛後值淋。甲寅年四月。用海金沙茵陳草薢。不
利。溫熱。夏季來。安入。冬仍舊。食物不消。味厚。久。經
溫氣。膠同陽明。脈洪。苦大涼。氣收。飲邪。阻氣。室滯。若

久病深。通氣必用緩法攻逐。用通氣血。佐以辛甘之味。
 華汁如厚朴 白芥子 韭白汁浸之。茯苓 桂木
 土炙穿甲 製事反 腐心 水法丸

坤葉莊方集

遺精淋濁尿血

四十五

一疏方集

此二方
日氣鬱發其

飲食不司運納人。以知脾胃不和。但夏季之濕。必傷太陰脾。濕甚生熱。熱必室于陽明。胃脈全以宣通氣分。使氣通。濕去熱清。四末微腫。黃赤無。除陽明之脈。若少得利。機關也。宜厚味。腥濁可食。

生指木 陳皮 姜仁 刺藜藜 茯苓 茯苓

草薢 桔梗 水瀉丸

此長夏之病。濕著太陰。熱在陽明。不食食物。最有黃黃症。腹之累。必須蔬食。使清濁轉運。謂因病致傷。病去自復。

桑白皮 茯苓皮 大腹皮 陳皮 茵陳 木通

厚朴 某菴子
久病休息脾胃皆弱。今反逐膝臂痛在疾溫。臂阻過經。
脈流行之氣。是以溫脾平。為經中之表。法已以痛緩臂。
仲。尚減量其其疾。某之立能復矣。

陳皮

感長夏濕熱。太陰陽明不司。旋運。唇里肌黃。疸之象。止痔養使難。熱注于腸。乃濕信。宜臍佐以清之泄之。

桃花

廣皮 葶藶
及病黃疸。是溫熱中焦脾胃之病。病
氣之積。蓄目微黃。肌腠脹耳鳴。於是氣鬱未為逆。陽蒸熱。
涼。

蒙之禍甚目微其肌腠腹耳鳴於是氣塞未為逆暢蓋壯

傷氣濕阻氣也。能慎口腹。經月天降可愈。

生益智仁 白朮 茯苓 廣皮 紫厚朴 澤瀉

生砂仁 苦參 右各礱細末。金石斛湯泛為丸。

此二方皆治痿痺

寒濕着關節。痰飲阻氣分。咳而痺痛。川桂枝 茯苓

熟附子 熟半夏 木防己 北細辛

風毒三載。侵蚀血液。年終半百。已陽事不舉。脛骨不勝步。趨可稱沉痾之症。外治無功。當以柔溫之劑。益精髓。壯筋骨。不得痿痺為上。虎脛骨 枸杞子 甘菊花 牛膝

肉苁蓉 川石斛

脈緩與四肢牽強。環跳髀尻牽引。壯年有此病。起四月中。

乃時濕邪入于經絡為痿痺之症。木防己 生白朮

羌活 防風 桂枝木 獨活 生黃芪 川草薢

後去羌活加片薑黃 當歸身。

內損痿痺起于幼年。非三因之邪。此攻逐通經及傷寒偏熱。愈治愈劇。蓋精氣暗消。痿維不為己用。溫柔固補。必須宣通。是靜中有動。血肉形氣如截路可久。皆若此。

雄羊肉腎 鹿茸 金櫻粉 虎骨膠 砂仁研末

當歸身 小茴香 杜芡薺 桑椹膏

鯀小足冷。肢膝四肢發癢。骨節腫痛。風濕已入經絡成痺。形脈皆虛。護衛以攻邪。 防風 生黃芪 片薑黃

羌活 當歸 獨活 海桐皮

風寒久必入脈絡。外衛陽失護。已現右肢麻木。雖鼻淵腦
寒。不可發散。議和血脈。以逐留邪。黃芪 歸身

防風根 川桂枝 木防已 明天麻熬膏

風為陽濕。為陰二氣相搏。窒於肌腠之里。着於關節。周行
不利。為痛。得三焦氣行。濕無沉着。氣痛病解。

飛滑石 紫厚朴 白菴仁 茯苓皮 通草 杏仁

木防已 大豆黃卷

吳大正

癰瘍痔漏門

癰核 肝虛痰癰結在項下。海石 香附 連翹 夏枯草

土貝母 天花粉 青黛 金銀花

行走吸熱。熱自上受。肺熱下移。大腸陰虛之質。陽隆成瘍。

有諸。清養金水以治其源。務在寂靜。莫專于藥功。

麥冬 金銀花 黑豆皮 甜北沙參 川石斛

痔血。糞前後皆有。用力盛齟縫血。足冷及膝。大便燥艱。此屬五液損傷。絡虛所致。炒焦當歸 炒黑枸杞子

炒鬆熟地黃 五味子 淡苳蓉

陰虛為

知識之年。情慾易動。陰火直升。直降。瘍久成漏。乃內連臟腑之絡。脂液滲洩。不得收合。此外治無益。姑停課誦之。擾動神氣。閑坐嬉悅。以調之。納食肌肉。可得久持。

人參 當歸 沙苑蒺藜 大麋茸 枸杞 生仲

此一字

男有女。疝門

和饑不欲食。則腹脹。小腹痠痛。乃肝胃兩經病耳。

肝
癰

炒黑杞子

小茴香

廣皮

厚朴

炒當歸

沙苑蒺藜

益智仁

茯苓

陰

脈形已小。痛移左右。由陽明虛厥。陰未悔。重按痛緩。

人參

生川椒

茯苓

細辛

舶茴香

附子

少腹急痛。脇中有形。因怒勞動肝。致氣血凝結。久恙不宜

峻攻。緩圖有益。

川棟子

桃仁

炒查

橘核

青皮

小茴香

五靈脂

青木香

當臍堅硬。上下氣不相通。此濁陰聚。阿魏溫潤泄穢通陽。

故腸中濁氣頻出。但結於足太陰經。炒黑川椒 茯苓

生淡乾薑

蔥白

炮黑附子

胡盧巴

開病原是肝腎虛結為癰疽。但子和七疳主方。半屬辛香。

開

泄既有盜汗遺精失血咳嗽等症。辛香非宜。變溫柔通補。

法。蒺藜 補骨脂 紫胡桃 魚膠 青鹽 茯神

栢子霜 雄羊肉腎煮丸

濕熱入肝而為癰疔。桂枝木 川草薺 晚蚕沙

茯苓皮 川黃栢 海金沙 青黛

脈沉遲。疔衝癰聚。收引拘急。求痛甚。是陽微陰濁痺阻。議

以劉藥。三建湯

脈沉伏。逆痛不止。厥陰挾衛氣為患。

製附子 淡茱萸 炙甘草 蔥白 炒白芍

久疔堅硬上攻。周身冰冷。顯然團一濁陰上干。冷汗如油。

須防陽脫。子和辛香破氣難用。與驅濁救陽一法。

炮附子 炒川烏 生乾薑 吳茱萸 雄猪胆用一枚

接服 橘核 川棟子 炒川椒 炮黑川烏 炮黑附子

青木香 炒黑柏茴香

右腸下痛入少腹陰囊腫大便利覺熱小溲不爽動怒肝膽氣鬱腸胃穀氣聚濕濕阻氣脹欲結疝瘕故痛

川棟子 小茴香 茯苓皮 青皮 橘核 青木香

大腹皮 炒延胡索 又照原方去延胡加 厚朴

山梔 茵陳 又用更衣丸

七疝肝病為多。子和辛香流氣丹。溪分利濕熱。皆治其有餘偏勝。今七旬老年。下焦陽已衰微。濁陰聚而為脹。據說安卧自息已。非實症。煖腎真少。佐泄肝。是通陽驅濁方法。

人參 熟附子 舶茴香 茯苓 金鈴子 川楝
色悴脈沉下焦疝瘕是衝任病乃肝腎精血不足致損耳。

精羊肉熬膏 茯苓 淡苳蓉 真沙苑蒺藜子

炒黑枸杞子 當歸 小茴香 膠丸服

濁陰聚則為脹疝墜則大便秘便通則腹形脹大腎肝之
病治宜宣通陽氣。

安息香 炮生川烏頭 炮黑川楝 淡乾薑

舶茴香 炮生黑川附 蒸餅漿搗和為丸。

少腹疝瘕冲年不曉因由起于夏月漸加腹脹夏季脾胃
司令水穀未運或當怫鬱致肝木鬱勃熱蒸氣結犯剋中
土使濕熱凝聚為脹雖非情慾致病已為內傷延綿一載

未痊非速愈之病矣。

川棟子

炒黑小茴香

青木香

蘆薈

炒橘核

黑山梔

炒黑山查肉

青皮

肝疝症也。

淡吳茱萸

川棟子

橘核

乾薑

肉桂

炒白芍

青木香

荔枝核

炒烏梅

後加七疝丸

地氣混矣。擬以前方去白芍青木香加入

牛膝

澤瀉

葫蘆巴

小茴香

橘核

荔枝核

脈微瀯左弦。跗躄麻冷。走動無力。少腹微滿。晝九日腫。察

神呆色衰。畏風怕寒。陽虛疝瘕難愈之疾。

人參

炒黑枸杞子

茯苓

茴香

熟附子

當歸

川椒

此

婦葉莊方案

經產淋帶女科雜治

聖

經產淋帶女科雜治

陽維失護。自覺背脊烘熱。汗則大泄。出不止。汗過則週身冰冷畏寒。且不成寐。寐則氣衝心跳。汗亦自止。以陰不內守。陽不外護主治。桂枝木 鹿茸 當歸身 白芍

人參 栢子仁 左牡蠣 茯神

經云。陽維為病。苦寒熱。陰維為病。苦心痛。蓋維脈乃一身之網維。陽司外護。陰主內營。若家庭夫婦。管轄內外事宜也。緣二炁日衰。營護不週。凡勞倦寒暄。皆乘其空隙為害。為害為熱。陰陽矛盾所致。是八脈奇經之病。溫補不能入脈。不效亦無害。若以濕淫客氣搜逐。其害大矣。矣桂枝木

人參 生鹿茸 鹿角霜 栢子仁 當歸身 茯神

多言耗氣。勞倦傷形。吸氣不利。痛起足跟。繼背脇肋奇經。雖非一肝腎所該。為多不入奇經之方不效也。

當歸 枸杞子 紫石英 生糯米 沙苑蒺藜
衝衛為病。氣逆而裏急。青皮 金鈴肉 淡吳茱萸

橘核 元胡 烏梅 沉香 代赭石

帶脈橫圍于腰。維脈挾內外踝而行。勞傷受寒。脈絡欹斜。不司擁護。而為癰疽麻木不仁。非小病也。久而痿痺癰瘰。瘰癧瘰癧。當歸身 生於潛木 淡薤蓉 肉桂 鹿角霜

後改桂薑木苓湯

產後下焦陰虧。焦煩思慮。陽升內風皆動。上盛下衰。久延為厥。石決明 小生地 茯神 龜版 阿膠

天冬 白芍

麻木。便^右淋瀝帶下。兩足冷逆。脊髀如墜。衝任不固。肝腎
胃關皆歌溫納其下。桑螵蛸 淡薤蓉 生杜仲

鹿角霜 巴戟天 炒杞子 沙苑蒺藜 茯苓

鮑魚^{四兩}煎汁泛為丸 每早服三錢紅棗湯送下。

懷孕子淋多熱在下焦。產即當愈。仍心熱嚕腰痠骨痛。是
虧生熱。主手養肝陰矣。穠豆皮 生地 續斷 茯神

湖蓮肉 阿膠 天門冬

產後十年晨泄形寒汗出。是下元陰傷及陽。奇脈不固。遵

古人用 局方四神丸

少腹微膨。經來後期多痛。秋冬膝跗冰冷。衝氣致左脇攻
觸。腕中脹悶痛不能食。此屬氣血鬱痺。脈不和。雖無性

命之危。然恐有不得孕育之累矣。

炒延胡 炒小茴香 川棟子肉 穿山甲 當歸尾

生牡蠣 炒煙盡五靈脂 生蒲黃 接服後藥

前方專主濕通氣血。痛果得緩。痰氣亦不上攻。觸今復形寒食不化。與養營方煎煖。衛任為孕育之基。

人參 紫石英 艾粉 四製香附 淡苳蓉 肉桂

歸身 巴戟天 各碾細末。以白花益母草膏為丸。

懷妊五月。晝夜身熱。據述病起惡阻。嘔吐。止熱未思。五月足太陰司胎。木火犯中。營衛自怯。必致胎不實。長滋養血液。佐以清肝膽氣中之熱。小生地 白芍 麥冬

阿膠 條芩 胡黃連

天癸當絕。今屢次崩漏。乃衝任脈衰。久漏成帶。延綿之病。且固其下。

烏鰂骨 小生地 鮑魚 茜草 阿膠 續斷

胎前瘡熱傷陰。產後下焦之陰更損。衝任脈不下。因氣冲
欬逆。嘔。午後潮熱。子後汗泄。皆陰虛損及陽位。夏令大熱
發泄。絡空。脇痛失血。雖頗納穀。大便溏泄。滑。勞下損。漸
天中上。故延綿不愈之病。醫藥無效。炒熟地 芡實

湖蓮 五味子 茯神 烏鰂魚骨

先病懷孕。到七八月。胎吸母氣。諸臟腑經絡先衰。自救不
暇。至寢食廢。嘔脹不納。日加衰憊。臨產可危。無治病成法。

人參 石蓮肉 川黃連 草決明

少年懷妊。惡阻。誤與殞胎。十餘年後。不孕育。每經來。周身
經絡暨痛。少腹痠觸寒熱。皆至。乃八脈交損。八脈之治。非
轉展不效。紫河車 歸身 阿膠 紫石英 小茴香

斬艾 茯苓 鹿角霜 枯黃芩 益母忡膏丸

質偏於熱。陰液易虧。女人肝為先天。月事雖准。而裏少乏
儲蓄。無以交會衝脈。此從不孕育之因由也。凡生氣陰血
皆根於陽。陽浮為熱。陰弱不主戀陽。脊背常痛。當從督任
二脈治。鹿胎 當歸 桂圓肉 桑螵蛸 元武版

茯苓 枸杞子 細子苓

泄瀉減食。經水不來。而寒熱欬嗽。日無間斷。據說。嗔怒病
起。其象已是勞怯。鬱勞經閉。最不易治。

人參 蒸冬朮 廣皮 茯苓 炙甘草 白芍

形冷驚怕。旬日經淋漏注。心怔悸若懸旌。自七八年產後。致病。夫肝主驚。腎主恐。產病先虛在下。奇經不為固束。急溫補固攝。仍佐通藥。其力可到八脈。紫石英 茯苓

人參 烏鰂骨 鹿茸 炒枸杞子 沙苑蒺藜

悵鬱內損。經阻。筋骨皆痛。損傷不復。即起勞怯。溫養流通。望其鬱痺氣血和融。若但清熱見血理嗽。百無一治。

當歸 生杜仲 桑寄生 炒枸杞子 生鹿角

遇勞氣洩胎墜。胎去下焦先空。足冷腰脊皆痛。陰陽兩損。但以溫養補之。懷孕即止。歸身 肉桂 白芍 茯苓

人參 沙苑蒺藜 枸杞子 雄羊內腎

產後失調。勞下損。必睽奇經。心腹痛寒熱。脊痠腰痠。形肌消燥。殆盡。若縷縷而治。即是存極。凡痛宜通補。而宣通能入奇經。患者年廿四歲。沙苑蒺藜。炒黑小茴香。

人參 麋茸 當歸身 炒黑杞子

又方 人參三錢 熟地五錢 紫石英一兩 肉桂心分後加三錢

自產後五日。惡露漸少。遂卒然右脇下痛。引少腹。手不可按。身體不能轉側。此乃卧着于右太早。致敗血橫行入絡。痛甚神迷昏亂。皆瘀腐濁氣上冒胞絡矣。此屬產後重病。夫痛則不通。議宣通脈絡之壅。黑豆皮 西琥珀末

生蒲黃 乳香 蘇木 益母草 五靈脂

黑珀失笑合方。惡露已下些少。而痛勢不減。此乃重病。藥

輕痰濁錮結。必有脹滿浮腫喘急之變。議用四生丹。熱熱童便化服。回生丹一丸。

蓄血有如狂喜忘症象。今絡中瘀聚。還注于衝脈。所以右
肱痛緩。而少腹痛脹大。便粘膩白滑。亦瘀濁之化。但必前
通溺濁。不致凶危。即痞痞癥瘕。猶可緩商調治矣。

大黑豆皮 杜牛膝 炒烟盡五靈脂 熱薑便

西瑤珀末 炒查肉 老韭白

的。

絡通痛減病已挽回。但少腹餘氣瘀留衝脈。不必以宿妻

為重只宜瀉通痰下。斯為得矣。用交加虎杖合方。加炒靈

脂

和薑同搗汁

大黑豆皮

琥珀末

川棟子

炒小茴香

知不足齋

林靈脂

白花益母膏丸

按服 當歸 沙苑蒺藜 桂圓肉 炒小茴香 炒杞子

另起一

炒桃仁 九方

生薑 甲

八錢 月酒 醋熬成膏

當歸 三

炒查肉 二

形

炒黑小茴香 酒炒香附

炒桃仁 三

膏丸 每服三錢

五旬因怒暴崩繼而氣冲腕悶嘔吐此陰既走洩陽升鬱

胃最多暴厥 烏雞 一隻 阿膠 湖蓮 生地 茯神

天門冬

女貞子

川石斛

麥冬

甜北參

膠丸服

經遲既通兩日驟止新婚未及半月溲溺痛腹中有形恐

延淋帶當通陽宣濁 老韭白

兩頭尖

炒黑小茴香

杜牛膝

當歸鬚

益母草

自雍正八年八月間生產血暈成瘵當七八朝後減食漸乳發渴惡心便難至今經水不通飲食減少每交節候常

覺倦憊。或稍勞碌。及偶着寒。即手面浮腫。喉痛面赤。腰痠。服溫補之劑。稍得效驗。兼有帶症。容易惱怒。今年飲食畧好。小腹膨痛。便燥有血。或便澹不爽。

紫石英 烏鰂骨 人參 當歸身 卷柏 桑寄生

川石斛 淡苳蓉 天冬 栢子霜 桂心 禹餘糧

枯黃芩 遠志肉 川楸 蜜丸服

三月小產宜涼。固下。雄烏雞一隻 青蒿汁 熟地黃

阿膠 天冬 知母 白芍 子芩 建蓮 桑寄生

悲泣過甚失音。經言憂則傷肺。及讀病原向來左脇有形。形春令陡發。衝氣神迷。氣急若厥。更問經來先期三日。月如此。夫左脇屬肝。肝為風臟。內寄相火。凡人身之氣左

升在肝。右降在肺。升太過必降不及。為木火反戕。柔金醫經逆乘。謂賊邪。最難向安。情志之患。皆曰內傷。怡悅調養。可望漸和。非朝夕改之藥圖。僥倖者耳。

甜北沙參 麥冬肉 清阿膠 鮮生地 鼈甲

列元 醋炙

生左牡蠣 丹參肉 鮮生地 大冬肉 茯神

胎前欬嗽。產後更加失血。脈來左數。咳甚嘔吐。是下虛氣逆。衝任內損。醫屢投肺藥。必致延為蓐勞。斷乳調理為上。

都氣丸 四錢 澹鹽湯送下 十服

火升心悸耳鳴。少寐。月經遲。患者時年廿八歲。

生地 阿膠 茯神 女貞子 栢子仁 天門冬

小產後去血過多。陰絡空隙。氣乘為脹。兩年食減。腹現青

筋已屬鋼疾。腎氣丸

奇。虛。腹。中。痠。痛。溫。補。佐。以。宣。通。其。力。可。以。入。八。脈。

鹿茸 白製鹿角霜 生紫石英 禹餘糧 大茴香

歸身 炒黑枸杞子 生杜仲粉 同州蒺藜 補骨脂

用滾水入鹽少許研開蒸餅為丸。丸須細堅。空心開水。下。

因勞胎損一月。

人參 當歸身 茯神 白芍 棗仁 桂心

膏方

人參 當歸身 沙苑蒺藜 鹿角霜 桂圓肉

茯苓 淡薏苡 枸杞子 熬膏服

安胎。 人參 生杜仲 蘇梗 茯苓 砂仁末

川續斷 廣皮 建蓮肉

丸方 烏骨雞 鹿膠 女貞子 生地黃 茯苓

烏鰂骨 旱蓮草 枸杞子 湖蓮肉 膠丸服

姪交三月。

蘇梗 炒白芍 茯苓 砂仁末 生穀芽 廣皮

丸方 生地黃 天門冬 製香烏 川石斛 桑葉

阿膠 胡麻 女貞子 茯苓 蜜丸服

產後潮。

山查 黑豆皮 益母草 炒砂糖

又方 細生地 澤蘭 黑豆皮 丹參 茯苓 炒山查

又方 栢子仁 茯苓 細生地 麻仁 丹參

丸方 人參 桑螵蛸 川續斷 毛鹿角 炒小茴香

土炒歸身 茯神 砂仁 醋炒元胡 青皮益母膏

熱勞丸方

生地 胡黃連 川斷 白芍 阿膠 丹參 茯神

湖蓮肉 女貞子 烏骨雞膏為丸

腰痛附方

人參 杜仲 熟地 歸身 麋角膠 胡桃 杞子

三旬有崩漏形體日加充壯此皆發洩外盛內虛如背部

周身肌腠之中熱烘肢體皆為動搖陰液內乏陽風旋鼓

病能篇云諸風掉眩皆屬肝木風木不寧陽明脈空暴中

暴厥皆由此而起細生地 柏子仁 麥冬 阿膠

裏

生白芍 茯神 冬桑葉 北沙參

此氣血不和。脈絡不通為脹。用大鍼砂丸脹減。其經水仍

阻左脇宿癥久聚。此病根未去。炒熟桃仁 生牡蠣

炒黑小茴香 炒延胡索 粗桂木 生香附

經邊心腹痛泄瀉十五歲 四製香附 川芎 延胡索

當歸身 南棗肉 煨木香 紅棗肉丸

膏脇刺痛虛里尤甚。頭暈跗腫形寒臨經諸病皆集。此病

久八脈損傷。調經和養氣血。不得見病治病。

川芎 沙苑蒺藜 桂心 鹿角霜 小茴香

茯苓 炒枸杞子 歸身 益母草膏為丸

寡居獨陰無陽。下焦常冷。瘕泄帶下。腰解入夜痛甚。自覺

腸腑膜脹而胸次似高突。腹形未見膨滿。凡諸腑皆陽。陽微必陰濁未聚。初夏曾定溫通奇經法原效。夏秋時邪暑濕客病。胎延痛復如昔。立冬後十日診議。

人參 川枳 小茴香 鹿茸 補骨脂 茯苓

歸身 熟附子 胡蘆巴 蒸餅煮糊為丸

帶下眩暈。心嘈熱。背惡寒。經未漸遲。屬陰虛奇經損傷。廿五歲

細生地 茯神 續斷 牡蠣 阿膠 生仲

栢子仁 湖蓮肉

思慮憂愁。謂之鬱。氣血暗傷。肌肉日瘦。不食不寐。心中時覺昏憤。是皆內因之症。釀痰為癰。枯槁成損。必得情懷開曠。斯鬱結可開。目下用藥。因夏秋失血以來。倏冷忽熱。腕

悶胸痛。自天柱挾脊至腰。痠如折。不但營衛偏歌。八脈皆失其職。司先議宣暢。脈絡勿以滋滯補瀉。

鹿角霜 當歸 炒枸杞子 茯苓 沙苑蒺藜

川桂枝 小茴香 炒香附

陽浮汗泄。如飢忽脹。眩暈麻痺。產前心痛。謂之子懸。病起於產後。由肝腎內虛。真氣不自收納。內風掀旋不已。病傳陽明。脈絡筋骨。不司步履。乃沉痾之疾。

河間地黃飲料中。去其附桂二味。餘藥熬取自然膏。連次小產。初傷衝任。久而督帶蹻維皆傷。八脈不勻約束。陰不下固。陽乃上浮。如經後期。淋帶晨泄。上熱下冷。浮腫。脊痠腰垂耳鳴不寐等症。久損不復。必以從陰引陽。通固。

兼用。若非積累工夫。未得旦晚得效。

香

人參 炒焦當歸 補骨脂 茯苓 青鹽 紫石英

鹿茸 炒黑小茴 生蘄艾 蒸餅丸服三四錢

小產未復。繼為血崩。二次腹中刺痛。帶下不已。當固衝任。

使絡血生聚。可望經調。鹿角霜 當歸身 紫石英

炒黑小茴香 沙苑蒺藜 枸杞子 炒黑蘄艾

熱并衝咽。欬嗽不止。兩足冷如冰。而至骨。脈得細促。先天

最弱。年不肯充。長倘經水忽閉。勞損難治。

滋腎丸 三錢 六服 早上淡鹽湯送下。

久病形神日消。脈象兼大。是謂脈無胃氣矣。上年夏季。曾

診便瀉。腹痛食減。舒肝健脾。疎補。春進安胃丸。總無效驗。

此生氣不至。女子當天癸將通之年。經脈氣機拂逆。久鬱
熱聚。漸為枯涸之象。議用涇石山鬱勞治法。相蓮肉
川芎 熟地 青蒿 查肉 歸身 香附 白芍
厚勞下損。不獨病屬八脈。則延及三焦。晨泄嘔食。心熱下
冷。吸短寒熱。用藥豈有止嗽清熱之理。扶得胃氣安穀。月
事仍來。方得回春。

異功加南棗

怒勞血吐。成升月餘。再吐自述。少腹常痛。反必身汗出。必
經水得通。可免乾血勞怯。醋炙鼈甲 炒山查肉
胡黃連 炒桃仁 炒元胡索 荊藜子
經來甚少。左堅搏仍然。咳。噎。嗽。涎沫。夜熱汗出。肝血南

枯已屬勞損。宜進甘緩以養肝胃。令其納穀。庶可望愈。若見熱投涼。希圖治嗽。胃傷速憊矣。

生地

沙苑蒺藜

女貞子

阿膠

石斛

黑梔

停經九月。少腹重墜而痛。及診少陰脈瀯小。並非妊象。且

衝任虛餒。怕其暴崩。八珍湯中加入砂仁。

經先期三日。熱多寒少。脈右弦大。血分偏熱。治厥陰瘡。邪

室在血。

生鼈甲

青蒿梗

冬桑葉

炒桃仁

川貝母

炒牡丹皮

暴崩去血過多。絡中空虛。浮陽挾內風。以心悸筋脈痠爽。

奇經病也。

熟地黃

女貞子

白芍藥

清阿膠

旱蓮草

湘蓮肉

冬季腹大。大便不爽。以通陽泄濁。初投相合。久則不應。寡居獨陰。無陽鬱。慮至少腹結瘕。其病根在肝。五旬外正氣日衰。邪不可峻攻矣。

六味湯中加入 茴香 川棟子

陰傷于下。熱氣上冒。脈左堅數。慮其失血。不可強迫通經。

丹參 柏子仁 茯苓 澤蘭 牡丹皮 生麥芽

附錄調經種子良方

此係原任提臺陳大人所傳。屢試效驗如神。論曰。夫調經之法。在乎肝脾。脾統血。肝藏血。如鬱怒傷肝。思慮傷脾。使脾虛不能統束。肝虛不能藏納。多有經氣不調之患。氣一縱。則血不隨。血不隨。則疾如蟲起。肢體困倦。面目瘰。

掃葉莊附錄

黃。日。晡。寒。熱。晝。靜。夜。熱。心。胸。脹。痞。腰。背。痠。軟。食。無。味。神。不。安。赤。白。帶。下。久。無。孕。育。或。致。半。產。俱。是。經。氣。不。調。所。致。

此藥宜多服。必生雙胎。屢驗。

香附一觔去皮打淨。此藥性溫無毒。分作八分製。一分酒浸和養血氣。

一分童便製。一。分。酒。離。中。之。陰。

一分醋浸。開氣鮮紫。

一分益母仁二兩。全浸去仁。

一分薑炒。化痰。

一分小茴香艾葉各二兩。同浸炒乾。去苗艾。

一分鹽水製。清於中之陽。

一分萊菔子紫蘇各三兩。全浸炒乾。去蘇菜二。

味。化滯開滯。

石製法。春秋浸三日。夏浸一日。冬浸五日。製法完淨。同入

砂鍋。加蘆艾四兩。無灰酒隨煮。隨攪。色黑為度。使氣完固。

平燥性。和調經順氣。女人之聖藥也。血氣之疾。俱不可缺。

珍之寶之。再用後藥開左。

當歸身 四兩。養血和氣。

撫芎 二兩。調肝平肝。

人參 二兩。益氣寧神。如無人參亦可。

天門冬 二兩。去心。

酸棗仁 二兩。微炒。清脾安神。

白茯苓 一兩。乳浸去皮。

麥冬 三兩。補血潤肺。

白朮 二兩。健脾理胃。

元胡索 一兩。五錢。散新。

條芩 二兩。五錢。安胎。

白芍 二兩。清肝平肝。

生地 四兩。生血涼血。汁拌炒。

熟地 四兩。補血。另煎汁拌炒。

炙甘草 九錢。中益氣。

黃肉 三兩。生精益元。

益母草 四兩。行氣養血。

橘紅 三兩。清痰理氣。

阿膠 二兩。始粉炒成珠。

砂仁 一兩。中理氣。

此方係王叔和經聖子良方

見聞錄拾遺錄

康方伯傳海上仙方

海參一斤 酒洗去砂

猪脊髓十條 去血無

龜版膠四兩 酒化

杜仲八兩 鹽水炮

鹿角膠四兩 酒化

瓦絲餅八兩 酒化

紫殼核桃肉一百枚 生打爛

右剉各碾細末。先將羊腰猪脊髓核桃肉各搗如泥。然後和龜鹿海參等膠。杵勻入石臼中。將諸藥末拌勻。杵

羊腰子十枚 批去血膜。生打爛。

甘州枸杞子四兩 炒脆

破故紙四兩 鹽水炒

淮牛膝四兩 酒洗

當歸身四兩 酒洗

巴戟肉四兩 鹽水炒

至八九千下方可為丸。丸梧子大。每服三錢。初服于七
日內。每日晨晝昏三次。用淡鹽湯開水黃酒挨次
送下。服至七日後。只于清早淡鹽湯送下。或用開水送
下。服餌亦可。

此方丸劑艱於嗣育者服之。頗有應效也。甲戌清和之
初因。

菊溪先生以掃葉莊方案囑鈔。其卷後有一瓢老人
附錄軍門陳公所傳調經種子良方一頁。竊思陰經
既調。陽不健運。則亦不能成其化育之功。適於殘編
檢得此方。附之於末。質諸。

高明。不識云可否。